

ОДНОРОДНЫЕ МОДЕЛИ И ГЕНЕРИЧЕСКИЕ РАСШИРЕНИЯ

К. Ж. Кудайбергенов

Аннотация: Изучается поведение теоретико-модельного понятия однородности при генерических расширениях основной модели теории множеств. Доказано, что если M — несчетная ω -насыщенная модель несуперстабильной теории, то существует генерическое расширение основной модели теории множеств, которое сохраняет кардиналы и в котором M не является однородной. Доказано также, что для моделей тотально трансцендентных теорий понятие однородности абсолютно. В случае моделей суперстабильных не тотально трансцендентных теорий показано, что иногда можно нарушить однородность в генерических расширениях, иногда нет. Библиогр. 6.

Введение

Пусть M — модель некоторой теории первого порядка. Рассмотрим M как элемент счетной транзитивной модели \mathcal{M} теории множеств ZFC. Нас будет интересовать вопрос о поведении теоретико-модельного понятия однородности при генерических расширениях модели \mathcal{M} . Мы докажем, что если M — несчетная ω -насыщенная и сколь угодно однородная модель несуперстабильной теории, то существует генерическое расширение модели \mathcal{M} , которое сохраняет кардиналы и в котором M не является однородной. (Отсюда, в частности, следует, что понятие однородности не является абсолютным в теоретико-множественном смысле. Это дает ответ на вопрос, заданный автору М. Г. Перетятыкиным.) Мы покажем, что однородность и насыщенность являются неабсолютными «разным»: в некоторых генерических расширениях однородность сохраняется, а насыщенность — нет. Все это содержится в § 2 данной работы. В § 3 мы покажем, что для моделей тотально трансцендентных теорий понятие однородности абсолютно. Что касается моделей суперстабильных не тотально трансцендентных теорий, то иногда можно нарушить однородность в генерических расширениях, а иногда нельзя.

Автор выражает искреннюю благодарность Ангусу Макинтайру за его интерес к данной работе и стимулирующие обсуждения.

§ 1. Предварительные сведения

В дальнейшем теоретико-множественная терминология, связанная с методом форсинга, будет соответствовать [1]. Мощность множества A будет обозначаться через $|A|$. Через $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ будем обозначать ординалы, через $\kappa, \lambda, \mu, \nu$ — бесконечные кардиналы, а через ω и ω_1 — первый и второй бесконечные кардиналы соответственно. Через a, b, \dots будем обозначать элементы (иногда последовательности элементов), через \bar{a}, \bar{b}, \dots — последовательности элементов, а через $\underline{a}, \underline{b}, \dots$ — последовательности последовательностей.

Пусть ${}^\alpha A$ — множество всех последовательностей длины α , состоящих из элементов множества A . Пусть ${}^{\lambda>}A = \bigcup_{\alpha < \lambda} {}^\alpha A$ и пусть ${}^{\lambda \geq}A = {}^{\lambda>}A \cup {}^\lambda A$. Если $\bar{a}, \bar{b} \in {}^{\lambda>}A$, то $\bar{a} \sqsubseteq \bar{b}$ будет означать, что \bar{a} — начальный отрезок \bar{b} . Если $\bar{b} \in {}^\lambda A$ и $\alpha < \lambda$, то через $\bar{b}|_\alpha$ обозначим начальный отрезок в \bar{b} длины α . Через $a \frown b$ будем обозначать последовательность, полученную присоединением b к концу последовательности a . Если $\bar{a}_\alpha \sqsubseteq \bar{a}_\beta$ для всех $\alpha < \beta < \gamma$, то объединение $\bigcup_{\alpha < \gamma} \bar{a}_\alpha$ последовательностей \bar{a}_α определяется как последовательность \bar{b} такая, что $\text{Range}(\bar{b}) = \bigcup_{\alpha < \gamma} \text{Range}(\bar{a}_\alpha)$ и $\bar{a}_\alpha \sqsubseteq \bar{b}$ для всех $\alpha < \gamma$. Длина последовательности \bar{a} будет обозначаться через $l(\bar{a})$.

Все необходимые сведения по теории моделей (особенно это касается §2) можно найти в [2]. Тип, реализуемый последовательностью \bar{a} над множеством A , будем обозначать через $\text{tr}(\bar{a}/A)$. Вместо $\text{tr}(\bar{a}/\emptyset)$ будем писать $\text{tr}(\bar{a})$. Выражение « p есть тип над A » будет означать, что $p = \text{tr}(a/A)$ для некоторого a .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. (1) Модель M называется λ -однородной, если для любого подмножества $A \subseteq M$ мощности $|A| < \lambda$ и любого $a \in M$ любое элементарное отображение из A в M продолжается до элементарного отображения из $A \cup \{a\}$ в M .

(2) Модель M называется *однородной*, если она $|M|$ -однородна.

Нетрудно понять, что понятие ω -однородности абсолютно. Заметим также, что если модель не является λ -однородной (λ произвольное), то она не является λ -однородной ни в каком (сохраняющем кардиналы) расширении основной модели теории множеств.

§ 2. Неабсолютность однородности

Сформулируем некоторые условия, при которых μ -однородность сохраняется, а μ^+ -однородность не сохраняется при генерических расширениях.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Пусть $B \subseteq {}^{\kappa>}A \times {}^{\kappa>}A$. Будем говорить, что множество B μ -замкнуто, если для любого $\lambda < \mu$ и любых $\langle \bar{a}_\alpha, \bar{b}_\alpha \rangle \in B$, $\alpha < \lambda$, таких, что $\bar{a}_\alpha \sqsubseteq \bar{a}_\beta$ и $\bar{b}_\alpha \sqsubseteq \bar{b}_\beta$ для всех $\alpha < \beta < \lambda$, выполняется $\langle \bigcup_{\alpha < \lambda} \bar{a}_\alpha, \bigcup_{\alpha < \lambda} \bar{b}_\alpha \rangle \in B$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. (1) Модель M имеет (κ, λ, μ) -свойство, если существуют \emptyset -определимое множество $A \subseteq {}^{\omega>}M$ мощности κ , элемент $a_0 \in A$ и μ -замкнутое множество $B \subseteq {}^{\mu>}M$ мощности λ такие, что

(i) $\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle \in B$ влечет $\text{tr}(\bar{a}) = \text{tr}(\bar{b})$;

(ii) для любых $b_0 \in A$ и $\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle \in B$ существует $\langle \bar{c}, \bar{d} \rangle \in B$ такое, что $\bar{a} \sqsubseteq \bar{c}$, $\bar{b} \sqsubseteq \bar{d}$ и $\text{tr}(\bar{c} \frown a_0) \neq \text{tr}(\bar{d} \frown b_0)$.

(Мы будем говорить, что A, a_0, B реализуют (κ, λ, μ) -свойство.)

(2) Модель M имеет $[\lambda, \mu]$ -свойство, если M имеет (κ, λ, μ) -свойство для некоторого κ .

Теорема 1. Пусть \mathcal{M} — счетная транзитивная модель ZFC, $M \in \mathcal{M}$ и $\mathcal{M} \models (M \text{ есть } \mu\text{-однородная модель, имеющая } [\lambda, \mu]\text{-свойство, } \lambda \leq \mu)$. Тогда существует генерическое расширение \mathcal{N} модели \mathcal{M} такое, что

(1) \mathcal{N} сохраняет кардиналы;

(2) $\mathcal{N} \models (M \text{ не является } \mu^+\text{-однородной})$;

(3) $\mathcal{N} \models (M \text{ } \mu\text{-однородна})$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Работаем в \mathcal{M} . Пусть A, a_0, P реализуют $[\lambda, \mu]$ -свойство. Определим частичный порядок на P , полагая

$$\langle \bar{c}, \bar{d} \rangle \leq \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle \iff \bar{a} \sqsubseteq \bar{c} \wedge \bar{b} \sqsubseteq \bar{d}.$$

Для $c \in A$ положим

$$D_c = \{ \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle \in P : \text{tp}(\bar{a} \hat{\ } a_0) \neq \text{tp}(\bar{b} \hat{\ } c) \}.$$

В силу $[\lambda, \mu]$ -свойства модели M множество D_c плотно.

Выберем \mathcal{M} -генерическое множество $G \subseteq P$. Пусть $\mathcal{N} = \mathcal{M}[G]$ — соответствующее генерическое расширение модели \mathcal{M} . Так как $|P| = \lambda$ (и, следовательно, P удовлетворяет λ^+ -условию антицепей), то ввиду [1, теорема 3.4] \mathcal{N} сохраняет каждый кардинал $\nu \geq (\lambda^+)^{\mathcal{M}}$. Так как P μ -замкнуто и $\lambda \leq \mu$, в силу [1, следствие 3.13] каждый кардинал $\kappa \leq \lambda^{\mathcal{M}}$ сохраняется в \mathcal{N} (заметим, что μ -замкнутость в нашем смысле — это μ' -замкнутость для любого $\mu' < \mu$ в смысле [1]). Таким образом, \mathcal{N} сохраняет кардиналы.

Теперь работаем в \mathcal{N} . Докажем утверждение (2). Полагаем

$$\bar{a}^* = \cup \{ \bar{a} : (\exists \bar{b}) (\langle \bar{a}, \bar{a} \rangle \in G) \}, \quad \bar{b}^* = \cup \{ \bar{b} : (\exists \bar{a}) (\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle \in G) \}.$$

Ясно, что $\text{tp}(\bar{a}^*) = \text{tp}(\bar{b}^*)$. Так как $|G| \leq |P| \leq \lambda \leq \mu$ и \bar{a}^* есть объединение последовательностей длины, меньшей чем μ , то $|\bar{a}^*| \leq \mu$. Пусть $c \in A$. Поскольку G является \mathcal{M} -генерическим и D_c плотно, то существует $\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle \in G \cap D_c$. Тогда $\text{tp}(\bar{a}) = \text{tp}(\bar{b})$, $\bar{a} \sqsubseteq \bar{a}^*$, $\bar{b} \sqsubseteq \bar{b}^*$ и $\text{tp}(\bar{a} \hat{\ } a_0) \neq \text{tp}(\bar{b} \hat{\ } c)$. Значит, $\text{tp}(\bar{a}^* \hat{\ } a_0) \neq \text{tp}(\bar{b}^* \hat{\ } c)$. Отсюда и из определенности множества A следует утверждение (2).

Осталось доказать (3). Пусть $\bar{a}, \bar{b} \in {}^{\mu>}M$, $c \in M$ и $\text{tp}(\bar{a}) = \text{tp}(\bar{b})$. Так как P μ -замкнуто, из [1, теорема 3.12] вытекает, что $\bar{a}, \bar{b}, c \in \mathcal{M}$. Поскольку $\mathcal{M} \models (M \text{ } \mu\text{-однородна})$, существует $d \in M$ такой, что $\mathcal{M} \models (\text{tp}(\bar{a} \hat{\ } c) = \text{tp}(\bar{b} \hat{\ } d))$ и, следовательно, $\mathcal{N} \models (\text{tp}(\bar{a} \hat{\ } c) = \text{tp}(\bar{b} \hat{\ } d))$.

Теорема 1 доказана.

Предложение 2. (1) Если модель M имеет (μ, λ, μ) -свойство, то M не является μ^+ -однородной.

(2) Если выполняется аксиома Мартина и модель M имеет (κ, ω, ω) -свойство для некоторого $\kappa < 2^\omega$, то M не является ω_1 -однородной.

(3) Если модель M не является μ^+ -однородной, то M имеет $[\lambda, \mu]$ -свойство для некоторого $\lambda \leq \mu$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (1) Пусть A, a_0, B реализуют (μ, λ, μ) -свойство. Пусть $A = \{a_\alpha : \alpha < \mu\}$. Используя (μ, λ, μ) -свойство, индукцией по $\alpha < \mu$ определим $\bar{a}_\alpha, \bar{b}_\alpha \in {}^{\mu>}M$ такие, что $\text{tp}(\bar{a}_\alpha) = \text{tp}(\bar{b}_\alpha)$, $\text{tp}(\bar{a}_\alpha \hat{\ } a_0) \neq \text{tp}(\bar{b}_\alpha \hat{\ } a_\alpha)$, $\bar{a}_\alpha \sqsubseteq \bar{a}_\beta$ и $\bar{b}_\alpha \sqsubseteq \bar{b}_\beta$ для всех $\alpha < \beta < \mu$. Полагаем $\bar{a}^* = \bigcup_{\alpha < \mu} \bar{a}_\alpha$, $\bar{b}^* = \bigcup_{\alpha < \mu} \bar{b}_\alpha$. Тогда $|\bar{a}^*| \leq \mu$, $|\bar{b}^*| \leq \mu$ и

$\text{tp}(\bar{a}^* \hat{\ } a_0) \neq \text{tp}(\bar{b}^* \hat{\ } a_\alpha)$ для всех $a_\alpha \in A$. Отсюда и из определенности множества A следует, что модель M не является μ^+ -однородной.

(2) Пусть A, a_0, B реализуют (κ, ω, ω) -свойство. Точно так же, как в теореме 1, определим частично упорядоченное множество (P, \leq) и плотные множества D_c , $c \in A$. Тогда P удовлетворяет условию счетности цепей и $|\{D_c : c \in A\}| \leq \kappa < 2^\omega$. По аксиоме Мартина существует совместимое множество $G \subseteq P$ такое, что $G \cap D_c \neq \emptyset$ для любого $c \in A$. Теперь так же, как в теореме 1, доказывается, что модель M не является ω_1 -однородной.

(3) Если модель M не является μ^+ -однородной, то существуют $a_0 \in M$ и $\bar{a}^*, \bar{b}^* \in \mu^{\geq}M$ такие, что $\text{tp}(\bar{a}^*) = \text{tp}(\bar{b}^*)$ и $\text{tp}(\bar{a}^* \frown a_0) \neq \text{tp}(\bar{b}^* \frown b_0)$ для любого $b_0 \in M$. Положим $A = M$ и $B = \{(\bar{a}, \bar{b}) \in \mu^{\geq}M \times \mu^{\geq}M : \bar{a} \sqsubseteq \bar{a}^*, \bar{b} \sqsubseteq \bar{b}^*\}$. Тогда A, a_0, B реализуют $[\lambda, \mu]$ -свойство, где $\lambda = |\bar{a}^*| \leq \mu$.

Предложение 2 доказано.

Теперь покажем, что существуют сколь угодно однородные модели, имеющие $[\lambda, \mu]$ -свойство.

Теорема 3. *Любая ω -насыщенная модель несуперстабильной теории имеет $[\omega, \omega]$ -свойство.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть M есть ω -насыщенная модель несуперстабильной теории T , Q — счетный плотный линейный порядок без конечных точек и

$$I = (\omega^{\geq}Q, P_{\alpha}, <, \triangleleft, h)_{\alpha \leq \omega},$$

где

- (i) $P_{\alpha} = \{\eta \in \omega^{\geq}Q : l(\eta) = \alpha\}$ для всех $\alpha \leq \omega$;
- (ii) $<$ есть лексикографический порядок на $\omega^{\geq}Q$;
- (iii) \triangleleft есть отношение «быть собственным начальным сегментом»;
- (iv) h есть такая бинарная функция, что $h(\eta, \nu)$ — наибольший общий начальный сегмент в η и ν .

Так как теория T не суперстабильна, в силу леммы 3.5 и теоремы 3.6 из [2, гл. VII] и теоремы компактности T имеет неразличимое сильно равномерное (Q, ω) -дерево вида $\langle\langle \varphi_{\alpha}, 1 \rangle : \alpha < \omega \rangle$ (φ_{α} — формула теории T). Это означает, что существует множество $\{\bar{a}_{\eta} : \eta \in \omega^{\geq}Q\}$ такое, что

- (1) \bar{a}_{η} реализует $\{\varphi_{\alpha}(\bar{x}, \bar{a}_{\eta|\alpha}) : \alpha < \omega\}$ для любого $\eta \in \omega^{\geq}Q$;
- (2) $\models \neg(\exists \bar{x})(\varphi_{\alpha+1}(\bar{x}, \bar{a}_{\eta \frown \langle j \rangle}) \wedge \varphi_{\alpha+1}(\bar{x}, \bar{a}_{\eta \frown \langle k \rangle}))$ для всех $j \neq k$ из Q , $\alpha < \omega$, $\eta \in {}^{\alpha}Q$;
- (3) для любого $n < \omega$ если $\langle \eta_i : i < n \rangle \simeq \langle \tau_i : i < n \rangle$ (т. е. эти последовательности реализуют один и тот же бескванторный тип в модели I), то $\text{tp}(\langle \bar{a}_{\eta_i} : i < n \rangle) = \text{tp}(\langle \bar{a}_{\tau_i} : i < n \rangle)$, где $\text{tp}(\dots)$ — тип в теории T .

Пусть $\eta^* \in \omega^{\geq}Q$. В силу ω -насыщенности модели M можно предполагать, что $\{\bar{a}_{\eta} : \eta \in \omega^{\geq}Q \cup \{\eta^*\}\} \subseteq M$. Положим

$$P = \{(\langle \bar{a}_{\eta_i} : i < n \rangle, \langle \bar{a}_{\tau_i} : i < n \rangle) : \eta_i, \tau_i \in \omega^{\geq}Q, i < n < \omega, \langle \eta_i : i < n \rangle \simeq \langle \tau_i : i < n \rangle\}.$$

Покажем, что ${}^mM, \bar{a}_{\eta^*}, P$, где $m = l(\bar{a}_{\eta^*})$, реализуют $[\omega, \omega]$ -свойство. Пусть $\langle \underline{a}, \underline{b} \rangle \in P$ и $\bar{e} \in {}^mM$. Нужно найти $\langle \underline{c}, \underline{d} \rangle$, удовлетворяющее условию

$$(4) \langle \underline{c}, \underline{d} \rangle \in P, \underline{a} \sqsubseteq \underline{c}, \underline{b} \sqsubseteq \underline{d} \text{ и } \text{tp}(\underline{c} \frown \bar{a}_{\eta^*}) \neq \text{tp}(\underline{b} \frown \bar{e}).$$

Пусть $\underline{a} = \langle \bar{a}_{\eta_i} : i < n \rangle$, $\underline{b} = \langle \bar{b}_{\eta_i} : i < n \rangle$. Выберем $\eta_n \in \omega^{\geq}Q$ такое, что

$$(5) \eta_n \triangleleft \eta^* \text{ и } \neg(\eta_n \triangleleft \eta_i) \text{ для любого } i < n.$$

Так как $\langle \underline{a}, \underline{b} \rangle \in P$, то $\langle \eta_i : i < n \rangle \simeq \langle \tau_i : i < n \rangle$. В силу плотности лексикографического порядка на $\omega^{\geq}Q$ существует $\tau_n \in \omega^{\geq}Q$ такое, что

$$(6) \langle \tau_i : i \leq n \rangle \simeq \langle \eta_i : i \leq n \rangle.$$

Поскольку $\eta_n \triangleleft \eta^*$, то $\eta_n \frown \langle j \rangle \triangleleft \eta^*$ для некоторого $j \in Q$. Пусть

$$(7) k \in Q, k \neq j, \eta = \eta_n \frown \langle j \rangle, \eta' = \eta_n \frown \langle k \rangle, \tau = \tau_n \frown \langle j \rangle.$$

В частности, имеем

$$(8) \eta \triangleleft \eta^*.$$

Из (5)–(7) следует

$$(9) \langle \eta_0, \dots, \eta_n, \eta \rangle \simeq \langle \eta_0, \dots, \eta_n, \eta' \rangle \simeq \langle \tau_0, \dots, \tau_n, \tau \rangle.$$

Заметим, что либо

$$(10) \text{tp}(\langle \bar{a}_{\eta^*}, \bar{a}_{\eta} \rangle) \neq \text{tp}(\langle \bar{e}, \bar{a}_{\tau} \rangle),$$

либо

$$(11) \text{tp}(\langle \bar{a}_{\eta^*}, \bar{a}_{\eta'} \rangle) \neq \text{tp}(\langle \bar{e}, \bar{a}_{\tau} \rangle).$$

Действительно, в противном случае $\text{tp}(\langle \bar{a}_{\eta^*}, \bar{a}_{\eta} \rangle) = \text{tp}(\langle \bar{a}_{\eta^*}, \bar{a}_{\eta'} \rangle)$. Отсюда и из (1) и (8) вытекает, что $\models \varphi_{\alpha}(\bar{a}_{\eta^*}, \bar{a}_{\eta}) \wedge \varphi_{\alpha}(\bar{a}_{\eta^*}, \bar{a}_{\eta'})$, где $\alpha = l(\eta)$. Вместе с (7) это противоречит условию (2).

Если выполняется (10), то полагаем $\underline{c} = \underline{a} \widehat{\ } \bar{a}_{\eta}$, если выполняется (11), то $\underline{c} = \underline{a} \widehat{\ } \bar{a}_{\eta'}$. Пусть $\underline{d} = \underline{b} \widehat{\ } \bar{a}_{\tau}$. Тогда из (9)–(11) получим (4).

Теорема 3 доказана.

Для нестабильных теорий можно доказать немного больше.

Теорема 4. *Любая κ -насыщенная модель нестабильной теории имеет $[\lambda, \lambda)$ -свойство для любого $\lambda \leq \kappa$, удовлетворяющего условию $\lambda^{<\lambda} = \lambda$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть M — κ -насыщенная модель нестабильной теории T , $\lambda \leq \kappa$ и $\lambda^{<\lambda} = \lambda$. В силу теоремы 2.13 из [2, гл. II] существуют формула $\varphi(\bar{x}, \bar{y})$ теории T , множество $I \subseteq {}^n M$ мощности λ , где $n = l(\bar{x}) = l(\bar{y})$, и отношение $<$ на I такие, что

- (1) $(I, <)$ — λ -насыщенный плотный линейный порядок;
- (2) $(I, <)$ — неразличимая последовательность в модели M ;
- (3) $(\forall a, b \in I)[a < b \iff \models \varphi(a, b)]$.

Пусть $A = {}^n M$, a_0 — произвольный (не максимальный и не минимальный) элемент из I и

$$B = \{ \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle \in {}^{\lambda>} I \times {}^{\lambda>} I : \text{tp}(\bar{a}) = \text{tp}(\bar{b}) \}.$$

Покажем, что A, a_0, B реализуют $[\lambda, \lambda)$ -свойство.

Так как $\lambda^{<\lambda} = \lambda$, то $|B| = \lambda$. Поскольку кардинал λ регулярен (в противном случае $cf(\lambda) < \lambda$ и, следовательно, $\lambda^{<\lambda} \geq \lambda^{cf(\lambda)} > \lambda$, что является противоречием), множество B λ -замкнуто. Пусть $b_0 \in A$ и $\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle \in B$. Нужно найти $\langle \bar{c}, \bar{d} \rangle \in B$ такое, что $\bar{a} \sqsubseteq \bar{c}$, $\bar{b} \sqsubseteq \bar{d}$ и $\text{tp}(\bar{c} \widehat{\ } a_0) \neq \text{tp}(\bar{d} \widehat{\ } b_0)$.

В силу (1) существуют $a_1, a_2 \in I$ такие, что

- (4) $a_1 < a_0 < a_2$;
- (5) $\bar{a} \widehat{\ } a_1$ и $\bar{a} \widehat{\ } a_2$ реализуют один и тот же тип в модели $(I, <)$.

С учетом равенства $\text{tp}(\bar{a}) = \text{tp}(\bar{b})$ (в теории T) отображение $f : \bar{a} \rightarrow \bar{b}$ является элементарным. В силу (3) f сохраняет порядок и потому ввиду (1) продолжается до сохраняющего порядок отображения $g : \bar{a} \cup a_1 \rightarrow I$. Пусть $b_1 = g(a_1)$ и $\bar{d} = \bar{b} \widehat{\ } b_1$. Если $\models \varphi(b_1, b_0)$, то полагаем $\bar{c} = \bar{a} \widehat{\ } a_2$; в противном случае — $\bar{c} = \bar{a} \widehat{\ } a_1$. Тогда согласно (3) и (4) имеем $\text{tp}(\bar{c} \widehat{\ } a_0) \neq \text{tp}(\bar{d} \widehat{\ } b_0)$. Так как g сохраняет порядок, в силу (2) и (5) $\text{tp}(\bar{c}) = \text{tp}(\bar{d})$.

Теорема 4 доказана.

ЗАМЕЧАНИЕ. Из теорем 3 и 4 нельзя убрать условие о насыщенности. Например, рассмотрим модель $M = (A \cup B, A, B, \leq)$, где $\leq \subseteq A \times A$, (A, \leq) изоморфно ω , $A \cap B = \emptyset$ и B может иметь какую угодно мощность. Тогда M однородна и остается однородной в любом расширении основной модели ZFC. Условие о не(супер)стабильности тоже нельзя убрать: в качестве очевидного примера достаточно рассмотреть любую модель чистой теории равенства (эта теория суперстабильна и даже тотально трансцендентна). Впрочем, в следующем параграфе мы покажем, что для моделей тотально трансцендентных теорий понятие однородности абсолютно.

Будем называть модель (супер)стабильной, если ее теория (супер)стабильна.

Теорема 5. (1) Для любого кардинала λ , удовлетворяющего условию $\lambda^{<\lambda} = \lambda$, существует однородная стабильная модель сколь угодно большой мощности в языке мощности λ , имеющая $(2^\lambda, \lambda, \lambda)$ -свойство.

(2) Существует однородная суперстабильная модель сколь угодно большой мощности в счетном языке, имеющая $(2^\omega, \omega, \omega)$ -свойство.

(3) Для любого $\kappa \geq 2^\omega$ и любого $\mu \geq \kappa$ существует κ -насыщенная суперстабильная модель мощности μ в счетном языке, имеющая (κ, ω, ω) -свойство.

Доказательство. (1) Зафиксируем λ , удовлетворяющее условию $\lambda^{<\lambda} = \lambda$. Рассмотрим модель $M = (\lambda^{\geq 2}, P_\alpha, E_\alpha, f_\alpha)_{\alpha \leq \lambda}$, где $E_\alpha = \{\langle a, b \rangle : a, b \in {}^\lambda 2, a|\alpha = b|\alpha\}$, $P_\alpha = {}^\alpha 2$, f_α — функция из ${}^\lambda 2$ на P_α такая, что $f_\alpha^{-1}(a) = \{b \in {}^\lambda 2 : a \sqsubseteq b\}$ для любого $a \in P_\alpha$.

Эта модель стабильна. Покажем, что она $(2^\lambda)^+$ -однородна. Модель M \emptyset -определима в модели $N = (\lambda^{\geq 2}, P'_\alpha, \leq')_{\alpha \leq \lambda}$, где $\leq' = \{\langle a, b \rangle : a, b \in {}^\lambda 2, a \sqsubseteq b\}$, $P'_\alpha = {}^\alpha 2$. Действительно, имеем $P_\alpha = P'_\alpha$, $f_\alpha(x) = y \iff P_\lambda(x) \wedge P_\alpha(y) \wedge y \leq' x$, $E_\alpha(x, y) \iff P_\lambda(x) \wedge P_\lambda(y) \wedge (\exists z)(P_\alpha(z) \wedge z \leq' x \sqcap y)$, где \sqcap — операция взятия точной нижней грани в частичном порядке \leq' , т. е.

$$x \sqcap y = z \iff z \leq' x \wedge z \leq' y \wedge \neg(\exists t)(z <' t \wedge t <' x \wedge t <' y).$$

(Как обычно, $z <' t$ означает $z \leq' t \wedge z \neq t$.)

Модель вида N изучалась в работе [3], и было доказано, что такая модель $(2^\lambda)^+$ -однородна.

Пусть X — подмножество модели N . Отображение $f : X \rightarrow N$ назовем *хорошим*, если

$$(a \leq' b \iff f(a) \leq' f(b)) \wedge l(a \sqcap b) = l(f(a) \sqcap f(b))$$

для всех $a, b \in X$. Из доказательства основной теоремы работы [3] следует, что любое хорошее отображение продолжается до автоморфизма модели N и, значит, является элементарным.

Пусть X — подмножество модели M . Рассмотрим элементарное (в M) отображение $f : X \rightarrow M$. Нужно доказать, что f продолжается до автоморфизма модели M . Имеем

$$a \leq' b \iff (\exists \alpha \beta)(P_\alpha(a) \wedge P_\beta(b) \wedge f_\beta^{-1}(b) \subseteq f_\alpha^{-1}(a)),$$

$$l(a \sqcap b) = \gamma \iff (\exists xy)(a \leq' x \wedge b \leq' y \wedge E_\gamma(x, y) \wedge E_{\gamma+1}(x, y)).$$

Отсюда и из элементарности f (в M) вытекает, что f — хорошее отображение и потому продолжается до автоморфизма g модели N . Так как модель M \emptyset -определима в модели N , то g является автоморфизмом модели M и $(2^\lambda)^+$ -однородность M доказана.

Пусть $A = P_\lambda$, a_0 — произвольный элемент из A и

$$B = \{\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle : \bar{a}, \bar{b} \in {}^\lambda(M - A), \text{tp}(\bar{a}) = \text{tp}(\bar{b})\}.$$

Покажем, что A , a_0 , B реализуют $(2^\lambda, \lambda, \lambda)$ -свойство.

Ясно, что $|A| = 2^\lambda$. Так как $\lambda^{<\lambda} = \lambda$, то $|B| = \lambda$. Поскольку кардинал λ регулярен (в противном случае $cf(\lambda) < \lambda$ и потому $\lambda^{<\lambda} \geq \lambda^{cf(\lambda)} > \lambda$, что является противоречием), множество B λ -замкнуто. Пусть $b_0 \in A$ и $\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle \in B$. Нужно найти $\langle \bar{c}, \bar{d} \rangle \in B$ такое, что $\bar{a} \sqsubseteq \bar{c}$, $\bar{b} \sqsubseteq \bar{d}$ и $\text{tp}(\bar{c} \frown a_0) \neq \text{tp}(\bar{d} \frown b_0)$.

Если $\text{tr}(\bar{a} \hat{a}_0) \neq \text{tr}(\bar{b} \hat{b}_0)$, то полагаем $\bar{c} = \bar{a}$ и $\bar{d} = \bar{b}$. Допустим, что $\text{tr}(\bar{a} \hat{a}_0) = \text{tr}(\bar{b} \hat{b}_0)$. Тогда отображение $f : \bar{a} \hat{a}_0 \rightarrow \bar{b} \hat{b}_0$ является элементарным и потому в силу однородности модели M продолжается до автоморфизма g модели M . Выберем элемент $a_1 \in M$ такой, что $a_1 <' a_0$ и $a_1 \not\prec' a'$ для любого элемента a' из \bar{a} . Это можно сделать, потому что $\bar{a} \in B \subseteq {}^{\lambda} \langle M - A \rangle$ и тем самым $l(\bar{a}) < \lambda$, а $a_0 \in A$ и потому $|\{a \in M : a <' a_0\}| = \lambda$.

Пусть $a_2, a_3 \in M$ — непосредственные последователи a_1 . Так как $a_1 <' a_0$, можно предполагать, что $a_2 <' a_0$. Пусть $b_2 = g(a_2)$. Поскольку g — автоморфизм, то $\text{tr}(\bar{a} \hat{a}_2 \hat{a}_0) = \text{tr}(\bar{b} \hat{b}_2 \hat{b}_0)$. Пусть h — отображение, которое меняет местами a_2 и a_3 и фиксирует $\bar{a} \hat{a}_1$. Тогда h является хорошим отображением и, следовательно, продолжается до автоморфизма модели N . Отсюда и из \emptyset -определимости модели M в N следует, что $\text{tr}(\bar{a} \hat{a}_3) = \text{tr}(\bar{a} \hat{a}_2)$. Полагаем $\bar{c} = \bar{a} \hat{a}_3$ и $\bar{d} = \bar{b} \hat{b}_2$. Тогда $\text{tr}(\bar{c}) = \text{tr}(\bar{a} \hat{a}_2) = \text{tr}(\bar{d})$ и потому $\langle \bar{c}, \bar{d} \rangle \in B$. Так как $a_2 <' a_0$ и $a_3 \not\prec' a_0$, для некоторого $\alpha < \lambda$ имеем $f_\alpha(a_0) = a_2$ и $f_\alpha(a_0) \neq a_3$. Следовательно,

$$\text{tr}(\bar{c} \hat{a}_0) = \text{tr}(\bar{a} \hat{a}_3 \hat{a}_0) \neq \text{tr}(\bar{a} \hat{a}_2 \hat{a}_0) = \text{tr}(\bar{b} \hat{b}_2 \hat{b}_0) = \text{tr}(\bar{d} \hat{b}_0).$$

Итак, существует $(2^\lambda)^+$ -однородная модель мощности 2^λ , имеющая $(2^\lambda, \lambda, \lambda)$ -свойство. Для того чтобы получить однородную модель, имеющую $(2^\lambda, \lambda, \lambda)$ -свойство и мощность $\mu > 2^\lambda$, добавим μ новых элементов к M , новый унарный предикат, чтобы отделить их от M , и больше никакой дополнительной структуры. Утверждение (1) доказано.

При $\lambda = \omega$ модель M суперстабильна, так что утверждение (2) тоже доказано. Осталось доказать (3). Так как M суперстабильна, для любого $\kappa \geq 2^\omega$ теория $Th(M)$ имеет насыщенную модель N мощности κ . Доказательство утверждения (1) показывает, что N имеет $(|P_\omega^N|, \omega, \omega)$ -свойство. Для того, чтобы получить κ -насыщенную модель, имеющую (κ, ω, ω) -свойство и мощность $\mu > \kappa$, действуем как раньше: добавляем μ новых элементов к N и новый унарный предикат.

Теорема 5 доказана.

Обозначим через $F_n(T)$ множество всех формул теории T с переменными x_0, \dots, x_{n-1} , а через $S_n(T)$ — множество всех n -типов (над \emptyset). Пусть $D(T) = \bigcup_{n < \omega} S_n(T)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4. Модель M называется *слабо насыщенной*, если все типы из $D(T)$ реализуются в M .

Теорема 6. Пусть \mathcal{M} — счетная транзитивная модель теории ZFC, $T \in \mathcal{M}$ и $M \in \mathcal{M}$ и $\mathcal{M} \models (M \text{ есть модель счетной теории } T \text{ такой, что } |D(T)| > \omega)$. Тогда существует генерическое расширение \mathcal{N} модели \mathcal{M} такое, что

- (1) \mathcal{N} сохраняет кардиналы;
- (2) $\mathcal{N} \models (M \text{ не является слабо насыщенной})$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Работаем в модели \mathcal{M} . Так как $|D(T)| > \omega$, то $|S_n(T)| > \omega$ для некоторого $n < \omega$. Полагаем

$$P = \{p : p \subseteq F_n(T), |p| < \omega, |U(p)| > \omega\},$$

где $U(p) = \{q \in S_n(T) : p \subseteq q\}$. Для $p, p' \in P$ полагаем $p \leq p' \iff p' \subseteq p$. Ясно, что (P, \leq) — частично упорядоченное множество. Для $q \in F_n(T)$ полагаем $D_q = \{p \in P : p \not\subseteq q\}$. Покажем, что множество D_q плотно. Пусть $p \in P$.

Тогда существует формула $\varphi \in F_n(T)$ такая, что $p \cup \{\varphi\} \in P$ и $p \cup \{\neg\varphi\} \in P$. Действительно, пусть

$$U = \cup\{U(p \cup \{\varphi\}) : \varphi \in F_n(T), |U(p \cup \{\varphi\})| \leq \omega\}.$$

Так как теория T счетна, то $|U| \leq \omega \cdot |F_n(T)| = \omega$. Поскольку $p \in P$, имеем $|U(p)| > \omega$. Следовательно, существуют $q, q' \in U(p) - U$, $q \neq q'$. Выберем формулу $\varphi \in q$ такую, что $\neg\varphi \in q'$. Тогда $q \in U(p \cup \{\varphi\})$ и если $|U(p \cup \{\varphi\})| \leq \omega$, то $q \in U$, что противоречит выбору q . Поэтому $|U(p \cup \{\varphi\})| > \omega$. Аналогично $|U(p \cup \{\neg\varphi\})| > \omega$. Следовательно, $p \cup \{\varphi\} \in P$ и $p \cup \{\neg\varphi\} \in P$. Так как q совместно, то либо $p \cup \{\varphi\} \not\subseteq q$, либо $p \cup \{\neg\varphi\} \not\subseteq q$ и плотность D_q доказана.

Выберем \mathcal{M} -генерическое множество $G \subseteq P$. Пусть $\mathcal{N} = \mathcal{M}[G]$ — соответствующее генерическое расширение модели \mathcal{M} . С учетом того, что P счетно и потому удовлетворяет условию счетности цепей, \mathcal{N} сохраняет кардиналы.

Теперь работаем в \mathcal{N} . Пусть $p^* = \cup G$. Ясно, что p^* есть n -тип над \emptyset . Покажем, что p^* опускается в M . Пусть $\bar{a} \in {}^n M$. Так как $M \in \mathcal{M}$ и модель \mathcal{M} транзитивна, то $\bar{a} \in \mathcal{M}$. Пусть $q = \text{tr}(\bar{a})$. Поскольку G есть \mathcal{M} -генерическое множество, а D_q плотно, существует $p \in G \cap D_q$. Тогда $p \subseteq p^*$ и $p \not\subseteq q$. Следовательно, $p^* \not\subseteq q$, и потому \bar{a} не реализует p^* . Итак, p^* опускается в M , поэтому модель M не является слабо насыщенной.

Теорема 6 доказана.

Следствие 7. Пусть \mathcal{M} — счетная транзитивная модель теории ZFC, $T \in \mathcal{M}$ и $M \in \mathcal{M}$ и $\mathcal{M} \models (M \text{ есть модель } \omega\text{-категоричной, но не } \omega\text{-стабильной теории } T)$. Тогда существует генерическое расширение \mathcal{N} модели \mathcal{M} такое, что

- (1) \mathcal{N} сохраняет кардиналы;
- (2) $\mathcal{N} \models (M \text{ не является } \omega_1\text{-однородной})$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как теория T не является ω -стабильной в \mathcal{M} , существует счетное множество $A \in \mathcal{M}$, $A \subseteq M$, такое, что $|D(T_A)| > \omega$, где T_A — теория модели $M_A = (M, a)_{a \in A}$. По теореме 6 существует генерическое расширение \mathcal{N} модели \mathcal{M} , которое сохраняет кардиналы и в котором модель M_A не является слабо насыщенной, а потому модель M не является ω_1 -насыщенной. Теория T остается ω -категоричной в \mathcal{N} , потому что по теореме Рыль-Нардзевского ω -категоричность эквивалентна следующему абсолютному условию: для любого $n < \omega$ теория T имеет лишь конечное число попарно неэквивалентных формул с n свободными переменными. Отсюда следует, что модель M не является ω_1 -однородной в \mathcal{M} .

Следствие 7 доказано.

Теперь покажем, что однородность и насыщенность неабсолютны «по-разному».

Теорема 8. Пусть \mathcal{M} — счетная транзитивная модель теории ZFC. Тогда для любого кардинала λ модели \mathcal{M} существуют $M \in \mathcal{M}$ и генерическое расширение \mathcal{N} модели \mathcal{M} такие, что

- (1) $\mathcal{M} \models (M \text{ есть } \lambda\text{-насыщенная модель})$;
- (2) \mathcal{N} сохраняет кардиналы;
- (3) $\mathcal{N} \models (M \lambda\text{-однородна, но не слабо насыщена})$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В качестве M возьмем λ -насыщенную модель теории счетного числа независимых унарных предикатов P_0, P_1, \dots (аксиомы этой теории утверждают, что любая конечная булева комбинация формул $P_0(x), P_1(x), \dots$

совместна). По теореме 6 существует генерическое расширение \mathcal{N} модели \mathcal{M} , которое сохраняет кардиналы и в котором модель M не является слабо насыщенной. Легко понять, что модель M остается λ -однородной в \mathcal{N} .

Теорема 8 доказана.

ЗАМЕЧАНИЕ. Легко понять, что если M — произвольная однородная модель теории бесконечного числа независимых унарных предикатов (эта теория суперстабильна, но не тотально трансцендентна), то M остается однородной в любом расширении основной модели ZFC. Вместе с теоремой 5 это показывает, что в суперстабильном не тотально трансцендентном случае иногда можно нарушить однородность в генерических расширениях, иногда нельзя.

§ 3. Тотально трансцендентный случай

Теорема 9. Пусть \mathcal{M} — счетная транзитивная модель теории ZFC, $M \in \mathcal{M}$ и $\mathcal{M} \models (M \text{ есть } \lambda\text{-однородная модель тотально трансцендентной теории})$. Тогда $\mathcal{N} \models (M \lambda\text{-однородна})$ для любого расширения \mathcal{N} модели \mathcal{M} , которое сохраняет кардиналы. Кроме того, если $\lambda = |M|$, то $\mathcal{N} \models (M \text{ однородна})$ для любого расширения \mathcal{N} модели \mathcal{M} (даже если оно не сохраняет кардиналы).

Для доказательства теоремы 9 нам потребуется некоторая подготовка.

Пусть $D(A)$ — множество всех типов над \emptyset , реализуемых конечными последовательностями элементов из A , и пусть D — множество вида $D(M)$, где M — модель. Множество A называется D -множеством, если $D(A) \subseteq D$. Полный тип p над множеством A называется D -типом, если $A \cup \{a\}$ является D -множеством для любого элемента a , реализующего p .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5. Модель M называется (D, λ) -однородной, если $D(M) = D$ и M λ -однородна.

По теореме Кейслера и Морли [4] если модель M (D, λ) -однородна, а D -множества A и B таковы, что $A \subseteq B$, $|A| < \lambda$ и $|B| \leq \lambda$, то любое элементарное отображение из A в M продолжается до элементарного отображения из B в M . Отсюда вытекает следующая

Лемма 10. Модель M (D, λ) -однородна тогда и только тогда, когда $D(M) = D$ и для любого подмножества $A \subseteq M$ мощности $|A| < \lambda$ любой D -тип над A реализуется в M .

Пусть p — тип над подмножеством A модели M . Определим $\dim(p, M)$ как наименьший кардинал λ такой, что $\lambda = |I|$ для некоторого максимального независимого над A множества I реализаций типа p в модели M .

Лемма 11. Пусть p — стационарный тип над подмножеством A модели M суперстабильной теории. Если $\dim(p, M) \geq \omega$, то $\dim(p, M) = |J|$ для любого максимального независимого над A множества J реализаций типа p в M .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО следует из леммы 4.20 и леммы 3.9 из [2, гл. III].

Лемма 12. Пусть M — модель тотально трансцендентной теории T и $\lambda > \omega$. Тогда следующие условия эквивалентны:

- (1) M λ -однородна;
- (2) M ω -однородна и $|I| \geq \lambda$ для любого максимального бесконечного неразличимого множества $I \subseteq M$;

(3) M ω -однородна и $\dim(p, M) \geq \lambda$ для любого такого стационарного 1-типа p над конечным подмножеством модели M , что $\dim(p, M) \geq \omega$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (1) \Rightarrow (2). Допустим, что существует максимальное бесконечное неразличимое множество $I \subseteq M$ мощности $|I| < \lambda$. Пусть $a \in I$ и $f : I - \{a\} \rightarrow I - \{a\}$ — произвольная биекция. Так как I — неразличимое множество, отображение f элементарно. Поскольку модель M λ -однородна, f продолжается до элементарного отображения $g : I \rightarrow M$. Но тогда I — собственное подмножество неразличимого множества $g(I)$, что противоречит максимальнойности I .

(2) \Rightarrow (3). Если p — стационарный тип над A , то любое независимое над A множество реализаций типа p в M является неразличимым.

(3) \Rightarrow (1). Пусть $A \subseteq M$, $|A| < \lambda$, и пусть $f : A \rightarrow M$ — элементарное отображение. Пусть $a \in M$ и $p = \text{tp}(a/A)$. Нужно доказать, что $f(p)$ реализуется в M . Пусть $D = D(M)$. По предложению 2.2 работы [5] существует (D, ω) -однородная модель N , которая содержит A и проста над A в классе (D, ω) -однородных моделей теории T . Так как N проста над A , можно предполагать, что N — элементарная подмодель модели M . Если $a \in N$, то $f(a)$ реализует $f(p)$, и лемма доказана. Предположим, что $a \notin N$. Пусть $q = \text{tp}(a/N)$. Поскольку теория T тотально трансцендентна, существует конечное $B \subseteq M$ такое, что q не ответвляется над B и $q \upharpoonright B$ стационарен. Индукцией по $n < \omega$ найдем элемент $a_n \in M$, реализующий тип $q_n = q \upharpoonright (B \cup \{a_i : i < \omega\})$. Это можно сделать с помощью леммы 10, потому что модель M (D, ω) -однородна, а q_n , очевидно, является D -типом над конечным множеством. Тогда $I = \{f(a_n) : n < \omega\}$ будет независимым над $f(B)$ множеством реализаций типа $f(q \upharpoonright B)$. Расширим I до максимального такого множества J в M . В силу (3) $|J| \geq \lambda$. В силу того, что тип p стационарен, J — неразличимое множество и $\text{Av}(J/N) = f(q)$. Так как теория T тотально трансцендентна, существует $J' \subseteq J$ такое, что $J - J'$ неразличимо над $f(A)$ и $|J'| \leq \omega + |f(A)| < \lambda$. Тогда $J - J'$ бесконечно и любой его элемент реализует $\text{Av}(J - J'/f(A)) = \text{Av}(J/f(A)) = f(q \upharpoonright A) = f(p)$.

Лемма 12 доказана.

Лемма 13. *Понятия неотвечаемости и независимости абсолютны.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Множество I независимо над A , если и только если для любого $a \in I$ тип $\text{tp}(a/A \cup (I - \{a\}))$ не ответвляется над A . Тип p не ответвляется над A , если и только если некоторая формула из p не ответвляется над A . Остается заметить, что формула $\varphi(x, \bar{c})$ не ответвляется над множеством A , если и только если существует формула $\delta(\bar{x})$ с параметрами из A , $\bar{x} = \langle x_0, \dots, x_n \rangle$, такая, что

$$\models (\exists \bar{x})\delta(\bar{x}) \wedge (\forall \bar{x})[\delta(\bar{x}) \rightarrow (\varphi(x_0, \bar{c}) \vee \dots \vee \varphi(x_n, \bar{c}))]$$

(см., например, [6]).

Лемма 13 доказана.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ. Пусть \mathcal{N} — расширение модели \mathcal{M} , которое сохраняет кардиналы. Работаем в \mathcal{N} . Как известно, понятие тотальной трансцендентности абсолютно, поэтому $\text{Th}(M)$ тотально трансцендентна (в \mathcal{N}). Докажем, что M λ -однородна, с помощью леммы 12. Как мы уже отмечали, понятие ω -однородности абсолютно, поэтому M ω -однородна (в \mathcal{N}). Пусть p — тип над конечным подмножеством A модели M , и пусть $\dim(p, M) \geq \omega$. В частности, некоторый элемент $a \in M$ реализует p . Заметим, что $a \in \mathcal{M}$, $A \in \mathcal{M}$ (так как A конечно) и $L(A) \in \mathcal{M}$, где $L(A)$ — множество формул с параметрами из

А. Так как $p = \{\varphi(x) \in L(A) : M \models \varphi(a)\}$ и « $M \models \varphi(a)$ » абсолютно, то $p \in \mathcal{M}$. Поскольку по лемме 13 понятие неотвечаемости абсолютно и p стационарен (в \mathcal{N}), то $\mathcal{M} \models (p \text{ стационарен})$. Пусть I — независимое над A множество реализаций типа p в M , $|I| = n < \omega$. Тогда $I \in \mathcal{M}$, и по лемме 13, $\mathcal{M} \models (I \text{ независимо})$. В силу того, что $\mathcal{M} \models (M \text{ } \omega\text{-однородна})$, $\mathcal{M} \models (\dim(p, M) \geq n)$ для любого $n < \omega$ и потому $\mathcal{M} \models (\dim(p, M) \geq \omega)$. Так как $\mathcal{M} \models (M \text{ } \lambda\text{-однородна})$, по лемме 12 $\mathcal{M} \models (\dim(p, M) \geq \lambda)$. Отсюда и из леммы 11 следует, что $\mathcal{N} \models (\dim(p, M) \geq \lambda)$, поэтому по лемме 12 $\mathcal{N} \models (M \text{ } \lambda\text{-однородна})$.

Теорема 9 доказана.

ЗАМЕЧАНИЕ. Точно так же доказывается аналог теоремы 9 для насыщенности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бердженс Дж. П. Вынуждение // Справочная книга по математической логике. Ч. II: Теория множеств. М.: Наука, 1982. С. 99–157.
2. Shelah S. Classification theory and the number of non-isomorphic models. Amsterdam: North-Holland, 1978.
3. Кудайбергенов К. Ж. Об одной гипотезе Шелаха // Алгебра и логика. 1987. Т. 26. С. 191–203.
4. Keisler H. J., Morley M. D. On the number of homogeneous models of a given power // Israel J. Math. 1967. V. 5. P. 73–78.
5. Кудайбергенов К. Ж. Об однородных моделях одномерностных теорий // Алгебра и логика. 1995. Т. 34, № 1. С. 61–78.
6. Harnik V. Generic formulas and types a la Hodges // The model theory of groups. Notre Dame: Notre Dame Univ. Press, 1989. P. 88–99.

Статья поступила 8 февраля 1998 г.

г. Алматы
Институт математики МОН РК
kanat@math.kz