

ЗАКОН ПОВТОРНОГО ЛОГАРИФМА  
ДЛЯ СЛАБО ЗАВИСИМЫХ СЛУЧАЙНЫХ  
ВЕЛИЧИН СО ЗНАЧЕНИЯМИ  
В ГИЛЬБЕРТОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

О. Ш. Шарипов

**Аннотация:** Рассматриваются ограниченный и компактный законы повторного логарифма для слабо зависимых случайных величин со значениями в гильбертовом пространстве. Для последовательностей одинаково распределенных гильбертовозначных случайных величин, удовлетворяющих условию равномерно сильного перемешивания, при оптимальных моментных условиях доказываются ограниченный и компактный законы повторного логарифма.

**Ключевые слова:** закон повторного логарифма, гильбертовозначная случайная величина, условие перемешивания.

Введение и формулировка результатов

В работе мы рассмотрим два вида закона повторного логарифма: ограниченный и компактный. Пусть  $\{X_n, n \geq 1\}$  — последовательность центрированных случайных величин (с.в.) со значениями в сепарабельном банаховом пространстве  $B$  (с нормой  $\|\cdot\|$  и сопряженным пространством  $B^*$ ).

Положим

$$S_n = X_1 + \dots + X_n, \quad Lx = \max(1, \ln x), \quad a_n = \sqrt{2nLLn}.$$

Мы будем говорить, что  $\{X_n, n \geq 1\}$  удовлетворяет ограниченному закону повторного логарифма (ОЗПЛ), если

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\|S_n\|}{a_n} < \infty \quad \text{п. н.}$$

Будем говорить, что  $\{X_n, n \geq 1\}$  удовлетворяет компактному закону повторного логарифма (КЗПЛ), если существует компактное множество  $K \subset B$  такое, что

$$C(\{S_n/a_n\}) = K \quad \text{п. н.}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|S_n/a_n - K\| = 0 \quad \text{п. н.},$$

где  $C(\{b_n\})$  означает множество предельных точек  $\{b_n\}$  и

$$\|S_n/a_n - K\| = \inf_{x \in K} \|S_n/a_n - x\|.$$

ОЗПЛ и КЗПЛ для последовательностей с.в. со значениями в бесконечномерных пространствах исследовались многими авторами (см. [1–8] и библиографию в них). Необходимые и достаточные условия справедливости ОЗПЛ и

КЗПЛ для последовательностей независимых одинаково распределенных (н.о.р.) с.в. со значениями в любом сепарабельном банаховом пространстве получены в [4]. В частности, если  $B$  — банахово пространство типа 2 (определение см., например, в [3]), то для ОЗПЛ необходимы и достаточны условия:

$$EX_1 = 0, \quad Ef^2(X_1) < \infty \quad \text{для всех } f \in B^*, \quad (1.1)$$

$$E\left(\frac{\|X_1\|^2}{LL\|X_1\|}\right) < \infty, \quad (1.2)$$

а для КЗПЛ необходимо и достаточно выполнение условий (1.1), (1.2) и следующего:

$$C(f, g) = Ef(X_1)g(X_1), \quad f, g \in B^*, \quad \text{непрерывна в } * \text{-слабой топологии.} \quad (1.3)$$

Условие (1.3) эквивалентно свойству равномерной интегрируемости семейства  $\{f^2(X_1), f \in B^*\}$ ;  $C(f, g)$  называется *ковариационной функцией*.

ОЗПЛ и КЗПЛ для слабозависимых с.в. со значениями в гильбертовых и банаховых пространствах получены в [9, 10]. Кроме того, ОЗПЛ и КЗПЛ можно получать как следствие почти наверное принципа инвариантности (ПНПИ). С результатами по ПНПИ для слабозависимых с.в. со значениями в бесконечномерных пространствах можно ознакомиться в обзорной статье [11]. Но все выше упомянутые результаты имеют одно общее свойство: для выполнимости ОЗПЛ и КЗПЛ требуется существование момента  $E\|X_k\|^{2+\delta}$ ,  $k = 1, 2, \dots$ , для некоторого  $\delta > 0$ .

В [12] автором доказано, что стационарная в узком смысле последовательность гильбертовозначных с.в.  $\{X_n, n \geq 1\}$ , для которой выполнены условия (1.1) и  $\varphi$ -перемешивания (с определенной скоростью убывания коэффициентов перемешивания) удовлетворяет ОЗПЛ тогда и только тогда, когда выполнено (1.2). Также было доказано, что (1.2) необходимо и достаточно для КЗПЛ, если  $\{X_n, n \geq 1\}$  вдобавок удовлетворяет условию типа (1.3) (более точно это условие будет приведено ниже).

В [13] результаты работы [4] обобщены для стационарной в узком смысле последовательности банаховозначных с.в.  $\{X_n, n \geq 1\}$ , удовлетворяющей условию  $m$ -зависимости.

Целью настоящей статьи является получение ОЗПЛ и КЗПЛ для необязательно стационарной последовательности с.в.  $\{X_n, n \geq 1\}$  со значениями в сепарабельном гильбертовом пространстве  $H$  (с нормой  $\|\cdot\|$ , порожденной скалярным произведением  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ , и сопряженным пространством  $H^*$ ). При этом мы будем предполагать, что  $\{X_n, n \geq 1\}$  удовлетворяет условию  $\varphi$ -перемешивания.

Введем коэффициенты перемешивания

$$\varphi(n) = \sup\{|P(A/B) - P(A)| : k \in N, B \in F_1^k, A \in F_{n+k}^\infty, P(B) > 0\},$$

где  $F_a^b$  —  $\sigma$ -алгебра, порожденная с.в.  $X_a, \dots, X_b$ .

Роль ковариационной функции из (1.3) в дальнейшем будет играть

$$T(f, g) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{Ef(S_n)g(S_n)}{n}, \quad f, g \in H^*,$$

что, очевидно, в случае н.о.р. с.в. совпадает с ковариационной функцией из (1.3).

Сформулируем результаты.

**Теорема 1.** Пусть  $\{X_n, n \geq 1\}$  — последовательность одинаково распределенных с.в. со значениями в  $H$ , удовлетворяющих следующим условиям:

$$Ef(X_1) = 0, \quad Ef^2(X_1) < \infty \quad \text{для всех } f \in H^*, \quad (1.4)$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \varphi^{\frac{1}{\theta}}(2^k) < \infty \quad \text{для некоторого } \theta > 3, \quad (1.5)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{Ef^2(S_n)}{n} = \sigma_f < \infty \quad \text{для всех } f \in H^*. \quad (1.6)$$

Тогда для того чтобы  $\{X_n, n \geq 1\}$  удовлетворяла ОЗПЛ, необходимо и достаточно, чтобы

$$E\left(\frac{\|X_1\|^2}{LL\|X_1\|}\right) < \infty. \quad (1.7)$$

**Теорема 2.** Пусть  $\{X_n, n \geq 1\}$  удовлетворяет условиям теоремы 1 и

$$T(f, g) \text{ непрерывна в } * \text{-слабой топологии.} \quad (1.8)$$

Тогда для того чтобы  $\{X_n, n \geq 1\}$  удовлетворяла КЗПЛ, необходимо и достаточно выполнение условия (1.7).

Условие (1.6) обеспечивает существование  $T(f, g)$ , так как для любых  $f, g \in H^*$  имеем  $h = f + g \in H^*$  и

$$\frac{1}{n}Eh^2(S_n) = \frac{1}{n}(E^2f(S_n) + 2Ef(S_n)g(S_n) + Eg^2(S_n)).$$

Остается перейти к пределу в обеих частях равенства и использовать условие (1.6).

Заметим, что условие (1.6) выполняется для слабо ортогональных последовательностей (см. [14]). Напомним, что последовательность  $\{X_n, n \geq 1\}$  называется слабо ортогональной, если для всех  $f \in H^*$  выполнено равенство

$$Ef(X_i)f(X_j) = 0 \quad i \neq j, \quad i, j \geq 1.$$

Условию (1.6) также удовлетворяют слабо стационарные последовательности с определенным коэффициентом  $\varphi$ -перемешивания (см. [9, 10]). Последовательность  $\{X_n, n \geq 1\}$  называется слабо стационарной, если

$$Ef(X_1)g(X_n) = Ef(X_{k+1})g(X_{k+n}) \quad \text{для всех } f, g \in H^*, \quad n, k \geq 1.$$

Для того чтобы слабо стационарная последовательность удовлетворяла (1.6), достаточно выполнения следующего условия:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \varphi^{1/2}(k) < \infty,$$

так как (имея в виду одинаковую распределенность) имеем

$$\frac{1}{n}Ef^2(S_n) = Ef^2(X_1) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right) Ef(X_1)f(X_{1+k}).$$

Теперь выполнимость условия (1.6) вытекает из следующего известного неравенства:

$$|Ef(X_1)f(X_{1+k})| \leq \varphi^{1/2}(k)Ef^2(X_1).$$

Условия (1.4) и (1.6) (и определение  $T(f, g)$ ) можно было записать, используя скалярное произведение, например

$$E\langle a, X_1 \rangle = 0, \quad E\langle a, X_1 \rangle^2 < \infty \quad \text{для всех } a \in H.$$

## Доказательство результатов

При доказательстве теорем мы существенно используем метод разделения на блоки Бернштейна и методы, развитые в работе [2].

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1. ДОСТАТОЧНОСТЬ. Всюду в дальнейшем буквой  $C$  будем обозначать абсолютные и неабсолютные константы, возможно, разные даже в одной цепочке неравенств. Они могут зависеть от разных параметров, но не зависят от индексов суммирования и от числа слагаемых (от  $n, p, q, m, r, k, i, j$  и т. д.). Необходимые утверждения будем формулировать в виде лемм. Ради удобства они приведены непосредственно перед их применением.

Пусть  $\beta > 1$ . Введем следующие обозначения:

$$n_k = [\beta^k], \quad I(k) = \{n_k + 1, \dots, n_{k+1}\}, \quad \tau_k = 2n_{k+1} L n_{k+1} = \alpha_{n_{k+1}}^2,$$

$$\Gamma = \sup_{x \in K} \|x\| = \sup_{\|f\| \leq 1} (T(f, f))^{1/2},$$

$[k]$  — целая часть  $k$ . Отношение  $a_n \sim b_n$  означает существование абсолютных констант  $c_1 > 0, c_2 > 0$  таких, что  $c_1 < a_n/b_n < c_2, n = 1, 2, \dots$ . Здесь  $K$  определяется в следующей лемме.

**Лемма 1** [1]. Пусть  $\mu$  — вероятностная мера на  $H$  с ковариационной функцией  $T(f, g)$ . Рассмотрим отображение  $S : H^* \rightarrow H$ , определенное следующим образом:

$$Sf = \int_H xf(x) d\mu(x),$$

где интеграл понимается в смысле Петтиса. Обозначим через  $H_\mu$  замыкание образа  $S$  и в  $H_\mu$  введем норму с помощью скалярного произведения

$$\langle Sf, Sg \rangle = \int_H f(x)g(x) d\mu(x) = T(f, g).$$

Тогда единичный шар  $K$  в  $H_\mu$  будет замкнутым симметричным выпуклым множеством и для всех  $f \in H^*$

$$\sup_{x \in K} f(x) = \left( \int_H f^2(y) d\mu(y) \right)^{1/2};$$

$K$  компактно тогда и только тогда, когда  $T(f, g)$  непрерывна в  $*$ -слабой топологии.

Существование вероятностной меры  $\mu$  с ковариационной функцией  $T(f, g)$  следует из утверждений гл. 3 (точнее, теоремы 2.2 на с. 142) книги [15]. При этом используются симметричность и положительная определенность  $T(f, g)$ .

Произведем срезку следующим образом:

$$u_j = X_j I(\|X_j\|^2 \leq \tau_k) - EX_j I(\|X_j\|^2 \leq \tau_k), \quad j \in I(k), \quad k = 1, 2, \dots,$$

$$w_j = X_j I(\|X_j\|^2 > \tau_k) - EX_j I(\|X_j\|^2 > \tau_k), \quad j \in I(k),$$

$$U_n = \sum_{j=1}^n u_j, \quad W_n = \sum_{j=1}^n w_j.$$

В определениях  $u_j$  и  $w_j$   $I(A)$  есть индикатор события  $A$ .

Покажем, что для всех  $\varepsilon > 0$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\|U_n\|}{a_n} \leq \Gamma + \varepsilon \quad \text{п. н.}, \quad (2.1)$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\|W_n\|}{a_n} = 0 \quad \text{п. н.}, \quad (2.2)$$

из которых в силу произвольности  $\varepsilon$  вытекает

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\|S_n\|}{a_n} \leq \Gamma \quad \text{п. н.} \quad (2.3)$$

Заметим, что достаточно доказать (2.3) при условии  $\Gamma > 0$ . Ради полноты доказательства приведем рассуждения из [13, с. 712], обосновывающее это замечание. Предположим, что для случая  $\Gamma > 0$  соотношение (2.3) доказано. Пусть последовательность  $\{X_n, n \geq 1\}$  удовлетворяет условиям теоремы 1 и для нее  $\Gamma = 0$ . Для фиксированного ненулевого  $x \in H$  рассмотрим последовательность  $\{X_n + \varepsilon_n x, n \geq 1\}$ , где  $\{\varepsilon_n, n \geq 1\}$  — последовательность н.о.р. с.в. с распределением

$$P(\varepsilon_1 = 1) = P(\varepsilon_1 = -1) = 1/2$$

и последовательности  $\{X_n, n \geq 1\}$  и  $\{\varepsilon_n, n \geq 1\}$  независимы. Легко видеть, что последовательность  $\{X_n + \varepsilon_n x, n \geq 1\}$  удовлетворяет условиям теоремы 1. Тем самым

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} \left\| \sum_{k=1}^n (X_k + \varepsilon_k x) \right\| \leq \sup_{\|f\| \leq 1} T_1^{1/2}(f, f) = \|x\| \quad \text{п. н.},$$

где

$$T_1(f, f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} E f^2 \left( \sum_{k=1}^n (X_k + \varepsilon_n x) \right).$$

Из закона повторного логарифма Хартмана — Винтнера имеем

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} \left| \sum_{k=1}^n \varepsilon_k \right| = 1 \quad \text{п. н.}$$

Далее,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} \left\| \sum_{k=1}^n X_k \right\| \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} \left\| \sum_{k=1}^n (X_k + \varepsilon_k x) \right\| + \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} \left\| \sum_{k=1}^n \varepsilon_k x \right\| \leq 2\|x\| \quad \text{п. н.}$$

Устремляя  $x$  к нулю, приходим к (2.3) в случае  $\Gamma = 0$ .

В дальнейшем будем считать, что  $\Gamma > 0$ .

**Лемма 2.** Если выполнено условие (1.7), то имеет место (2.2).

Эта лемма доказана в [2] для случая независимых с.в., но без применения свойства независимости. Вновь ради полноты мы приведем доказательство этой леммы из [2].

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЕММЫ 2.** Из условия (1.7) и леммы Бореля — Кантелли следует, что для (2.2) достаточно доказать равенство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} \left\| \sum_{j=1}^n E X_j I(\tau_k < \|X_j\|^2) \right\| = 0.$$

В свою очередь, для последнего соотношения достаточно доказать, что

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^r \sum_{j \in I(k)} E(\|X_j\| I(\tau_k < \|X_j\|^2)) / \sqrt{n_r LL n_r} = 0.$$

Имеем

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^r \sum_{j \in I(k)} \frac{E(\|X_j\| I(\tau_k < \|X_j\|^2))}{\sqrt{n_r LL n_r}} &\leq \sum_{k=1}^r \frac{n_{k+1} - n_k}{\sqrt{n_r LL n_r}} E(\|X_1\| I(\tau_k < \|X_1\|^2)) \\ &\leq c \sum_{k=1}^r \frac{n_{k+1} - n_k}{\sqrt{n_r LL n_r}} E\left(\frac{\|X_1\|^2}{LL \|X_1\|} I(\tau_k < \|X_1\|^2)\right) \frac{LL \tau_k}{\tau_k^{1/2}}. \end{aligned}$$

Теперь необходимое для нас соотношение вытекает из того, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} E\left(\frac{\|X_1\|^2}{LL \|X_1\|} I(\tau_k < \|X_1\|^2)\right) = 0$$

и

$$\sum_{k=1}^r (n_{k+1} - n_k) \frac{LL \tau_k}{\tau_k^{1/2}} = O\left(\sqrt{LL n_r} \sum_{k=1}^r \beta^{k/2}\right).$$

Лемма 2 доказана.

Докажем (2.1). Покажем существование такого  $\beta > 1$ , что

$$\limsup_{r \rightarrow \infty} \max_{n \in I(r)} \left\| \frac{U_n}{a_n} \right\| \leq \Gamma + \varepsilon \quad \text{п. н.} \quad (2.4)$$

В силу возрастания  $a_n$  имеем

$$\max_{n \in I(r)} \left\| \frac{U_n}{a_n} \right\| \leq \frac{a_{n_{r+1}}}{a_{n_r}} \max_{n \in I(r)} \left\| \frac{U_n}{a_{n_{r+1}}} \right\| \leq \sqrt{\beta} \max_{n \in I(r)} \left\| \frac{U_n}{a_{n_{r+1}}} \right\| \quad \text{п. н.}$$

Так как мы можем выбрать  $\beta$  сколь угодно близким к единице, для (2.4) достаточно доказать, что

$$\limsup_{r \rightarrow \infty} \max_{n \in I(r)} \left\| \frac{U_n}{a_{n_{r+1}}} \right\| \leq \Gamma + \varepsilon \quad \text{п. н.} \quad (2.5)$$

Теперь произведем секционирование (разделение на блоки) следующим образом. Зафиксировав  $n \in I(r)$ , для натуральных  $p$  и  $q$  положим

$$\xi_i = \sum_{j=(p+q)(i-1)+1}^{(p+q)(i-1)+p} u_j, \quad \eta_i = \sum_{j=(p+q)i-q+1}^{(p+q)i} u_j.$$

Для  $n \in I(r)$  имеем

$$U_n = \sum_{i=1}^m \xi_i + \sum_{i=1}^k \eta_i + U_0,$$

где  $U_0$  — «остаток», получающийся после блокирования  $\xi_1, \eta_1, \xi_2, \eta_2, \dots$ , до тех пор пока для очередного  $\xi$  или  $\eta$  не будет достаточного количества  $X_i$ . Заметим, что

$$m = m(n), \quad k = k(n), \quad |m - k| \leq 1.$$

Выбираем

$$p = \left[ \frac{\beta^r}{r^\gamma} \right], \quad 2 < \gamma < \theta - 1, \quad q = [\beta^{\alpha r}], \quad 0 < \alpha < 1. \quad (2.6)$$

Тогда  $m \sim k \sim r^\gamma$ .

Далее,

$$\begin{aligned} \limsup_{r \rightarrow \infty} \max_{n \in I(r)} \left\| \frac{U_n}{a_{n_{r+1}}} \right\| &\leq \limsup_{r \rightarrow \infty} \max_{n \in I(r)} \frac{1}{a_{n_{r+1}}} \left\| \sum_{i=1}^m \xi_i \right\| \\ &+ \limsup_{r \rightarrow \infty} \max_{n \in I(r)} \frac{1}{a_{n_{r+1}}} \left\| \sum_{i=1}^k \eta_i \right\| + \limsup_{r \rightarrow \infty} \max_{n \in I(r)} \left\| \frac{U_0}{a_{n_{r+1}}} \right\| \quad \text{п. н.} \end{aligned} \quad (2.7)$$

Покажем, что два последних слагаемых в правой части (2.7) п. н. равны нулю. При этом мы существенно будем использовать моментные неравенства, доказанные в [16], которые сформулируем в виде следующей леммы.

**Лемма 3.** Пусть  $\{X_n, n \geq 1\}$  — последовательность центрированных с.в. со значениями в  $H$ , удовлетворяющая (1.5). Тогда для  $t \geq 2$  имеет место следующее неравенство:

$$E \max_{1 \leq k \leq n} \|S_k\|^t \leq C \left( \sum_{k=1}^n E \|X_k\|^t + \left( \sum_{k=1}^n E \|X_k\|^2 \right)^{t/2} \right).$$

Применяя лемму 3 и простое неравенство

$$E \|X_1 I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r) - EX_1 I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r)\|^2 \leq 4E \|X_1\|^2 I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r),$$

получим

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^{\infty} P \left( \max_{n \in I(r)} \left\| \frac{U_0}{a_{n_{r+1}}} \right\| > \varepsilon \right) &\leq \sum_{r=1}^{\infty} \frac{E \max_{n \in I(r)} \|U_0\|^2}{\varepsilon^2 a_{n_{r+1}}^2} \leq \sum_{r=1}^{\infty} \frac{Cp E(\|X_1\|^2 I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r))}{\varepsilon^2 a_{n_{r+1}}^2} \\ &\leq \sum_{r=1}^{\infty} \frac{Cp}{\varepsilon^2 \beta^r} E \left( \frac{\|X_1\|^2}{LL \|X_1\|} I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r) \frac{LL \|X_1\|}{LL \tau_r} \right). \end{aligned}$$

Из (2.6) вытекает сходимость последнего ряда.

Точно так же

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^{\infty} P \left( \max_{n \in I(r)} \left\| \frac{1}{a_{n_{r+1}}} \sum_{i=1}^k \eta_i \right\| > \varepsilon \right) &\leq \sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{\varepsilon^2 a_{n_{r+1}}^2} E \max_{n \in I(r)} \left\| \sum_{i=1}^k \eta_i \right\|^2 \\ &\leq \sum_{r=1}^{\infty} \frac{Ckq}{\varepsilon^2 a_{n_{r+1}}^2} E(\|X_1\|^2 I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r)) \\ &\leq \sum_{r=1}^{\infty} \frac{Ckq}{\varepsilon^2 \beta^r} E \left( \frac{\|X_1\|^2}{LL \|X_1\|} I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r) \frac{LL \|X_1\|}{LL \tau_r} \right). \end{aligned}$$

Опять (2.6) влечет сходимость последнего ряда. Следовательно, по лемме Бореля — Кантелли два последних слагаемых в правой части (2.7) п. н. равны нулю.

Для того чтобы оценить первое слагаемое в правой части неравенства (2.7), сначала приходим к неравенству

$$\begin{aligned}
& \sup_{n \in I(r)} P \left( \left\| \sum_{i=1}^{m(n)} \xi_i - \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \xi_i \right\| > \frac{\varepsilon}{2} a_{n_{r+1}} \right) \\
& \leq \sup_{n \in I(r)} P \left( \left\| \sum_{i=m(n)+1}^{m([\beta^{r+1}])} \xi_i \right\| > \frac{\varepsilon}{2} a_{n_{r+1}} \right) \leq C \frac{1}{a_{n_{r+1}}} \sup_{n \in I(r)} \left\| \sum_{i=m(n)+1}^{m([\beta^{r+1}])} \xi_i \right\| \\
& \leq \frac{C}{a_{n_{r+1}}} \left( \left[ \frac{\beta^{r+1}}{p} \right] - \left[ \frac{\beta^r}{p} \right] \right)^{1/2} \sup_{n \in I(r)} \max_{m(n) \leq i \leq m([\beta^{r+1}])} (E \|\xi_i\|^2)^{1/2} \\
& \leq C \frac{r^{\gamma/2} p^{1/2}}{a_{n_{r+1}}} (E \|X_1 I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r) - E X_1 I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r)\|^2)^{1/2} \\
& \leq C \frac{\beta^{r/2} LL\tau_r}{a_{n_{r+1}}} \left\{ E \left( \frac{\|X_1\|^2}{LL\|X_1\|} I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r) \frac{LL\|X_1\|}{LL\tau_r} \right) \right\}^{1/2} \\
& \leq C \left\{ E \left( \frac{\|X_1\|^2}{LL\|X_1\|} I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r) \frac{LL\|X_1\|}{LL\tau_r} \right) \right\}^{1/2}. \quad (2.8)
\end{aligned}$$

Последняя величина при  $r \rightarrow \infty$  стремится к нулю.

Теперь используем следующую лемму.

**Лемма 4.** Пусть  $\{X_n, n \geq 1\}$  —  $\varphi$ -перемешивающаяся последовательность с.в. со значениями в  $H$ . Если для некоторого  $a$

$$\min_{1 \leq j \leq n} P(\|S_n - S_j\| < a) - \varphi(1) > 0,$$

то для всех  $x \in R$

$$P(\max_{1 \leq k \leq n} \|S_k\| > x) \leq (\min_{1 \leq j \leq n} P(\|S_n - S_j\| < a) - \varphi(1))^{-1} P(\|S_n\| > x - a).$$

Эта лемма доказана в [17] для одномерных с.в. Для гильбертовозначных с.в. лемма доказывается точно так же, с той лишь разницей, что вместо абсолютного значения надо использовать норму.

Выбирая  $r$  настолько большим, чтобы выполнялось  $\varphi(q) < 1$ , и применяя (2.8) и лемму 4, получим

$$P \left( \max_{n \in I(r)} \left\| \sum_{i=1}^{m(n)} \xi_i \right\| > (\Gamma + \varepsilon) a_{n_{r+1}} \right) \leq CP \left( \left\| \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \xi_i \right\| > \left( \Gamma + \frac{\varepsilon}{2} \right) a_{n_{r+1}} \right).$$

Дальнейшая наша цель — показать, что

$$\sum_{r=1}^{\infty} P \left( \left\| \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \xi_i \right\| > \left( \Gamma + \frac{\varepsilon}{2} \right) a_{n_{r+1}} \right) < \infty.$$

По теореме Беркеша — Филиппа [18] существует последовательность независимых с.в.  $\{y_i\}$  в  $H$  таких, что  $y_i$  и  $\xi_i$  одинаково распределены и

$$P(\|\xi_i - y_i\| > 6\varphi(q)) \leq 6\varphi(q), \quad i = 1, 2, \dots$$

Так как из (1.5) и (2.6) имеем

$$\sum_{r=1}^{\infty} P\left(\left\|\sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} (\xi_i - \eta_i)\right\| > \frac{\varepsilon}{4} a_{n_{r+1}}\right) \leq \sum_{r=1}^{\infty} C m([\beta^{r+1}]) \varphi(q) < \infty,$$

нам остается доказать, что

$$\sum_{r=1}^{\infty} P\left(\left\|\sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} y_i\right\| > \left(\Gamma + \frac{\varepsilon}{4}\right) a_{n_{r+1}}\right) < \infty. \quad (2.9)$$

Используем следующую лемму.

**Лемма 5** (см. [2]). Пусть  $\{Z_i, i \geq 1\}$  — последовательность независимых предгауссовских с.в. со значениями в  $B$ , где  $B$  — банахово пространство типа 2, норма (точнее вторая производная Фреше нормы) которого удовлетворяет следующим условиям:

а)  $\sup_{\|x\|=1} \|D_x^2\|_1 < \infty,$

б)  $D_x^2$  удовлетворяет условию Гёльдера с показателем  $\alpha$  вне точки 0.

Здесь  $D_x^2$  означает вторую производную Фреше нормы в точке  $x$  и  $\|\cdot\|_1$  — стандартную норму второй производной Фреше.

Тогда

$$\left|E\left(g\left(\sum_{j=1}^n Z_j\right)\right) - E\left(g\left(\sum_{j=1}^n G_j\right)\right)\right| < C(\delta, \Lambda, \alpha) \sum_{j=1}^n \|Z_j\|^{2+\alpha},$$

где  $\{G_i, i \geq 1\}$  — последовательность независимых гауссовских с.в. в  $B$  таких, что  $G_i$  имеет тот же ковариационный оператор, что и  $Z_i$ ,  $g(x) = \Phi(\|x\|)$ ,  $\Phi(t) = 0$  при  $0 \leq t \leq \Lambda$ , возрастает при  $\Lambda \leq t \leq \Lambda + \delta$  и  $\Phi(t) = 1$  при  $t \geq \Lambda + \delta$ ,  $\Lambda > 0$ ,  $\delta > 0$ ;  $C(\delta, \Lambda, \alpha)$  — константа, зависящая только от  $\delta, \Lambda, \alpha$  и не зависящая от  $\{Z_i, i \geq 1\}$  и  $\{G_i, i \geq 1\}$ .

Так как последовательность  $\{y_i, i \geq 1\}$  и гильбертово пространство удовлетворяют условиям леммы 5 (с  $\alpha = 1$ ), то, выбирая  $\Lambda = \Gamma + \varepsilon/8$ ,  $\delta = \varepsilon/8$ , получим

$$\begin{aligned} P\left(\left\|\sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} y_i\right\| > \left(\Gamma + \frac{\varepsilon}{4}\right) a_{n_{r+1}}\right) &\leq E\left(g\left(\sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} y_i/a_{n_{r+1}}\right)\right) \\ &\leq E\left(g\left(\sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} G_i/a_{n_{r+1}}\right)\right) + C \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \frac{E\|y_i\|^3}{a_{n_{r+1}}^3}. \end{aligned} \quad (2.10)$$

Подставляя (2.10) в ряд (2.9), оценим второе слагаемое, используя лемму 3:

$$\begin{aligned} &\sum_{r=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \frac{E\|y_i\|^3}{a_{n_{r+1}}^3} = \sum_{r=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \frac{E\|\xi_i\|^3}{a_{n_{r+1}}^3} \\ &\leq \sum_{r=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \frac{C}{a_{n_{r+1}}^3} \left[ \sum_{j=(p+q)(i-1)+1}^{(p+q)(i-1)+p} E\|X_j I(\|X_j\|^2 \leq \tau_r) - EX_j I(\|X_j\|^2 \leq \tau_r)\|^3 \right. \\ &\quad \left. + \left( \sum_{j=(p+q)(i-1)+1}^{(p+q)(i-1)+p} E\|X_j I(\|X_j\|^2 \leq \tau_r) - EX_j I(\|X_j\|^2 \leq \tau_r)\|^2 \right)^{\frac{3}{2}} \right] = \text{I} + \text{II}. \end{aligned}$$

Оценим каждое слагаемое в отдельности:

$$\begin{aligned}
 \Pi &= \sum_{r=1}^{\infty} \left( \sum_{i=1}^{m(\lfloor \beta^{r+1} \rfloor)} \frac{C}{a_{n_{r+1}}^3} \sum_{j=(p+q)(i-1)+1}^{(p+q)(i-1)+p} E \|X_j I(\|X_j\|^2 \leq \tau_r) \right. \\
 &\quad \left. - E X_j I(\|X_j\|^2 \leq \tau_r) \right)^{\frac{3}{2}} \\
 &\leq \sum_{r=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{m(\lfloor \beta^{r+1} \rfloor)} \frac{C}{a_{n_{r+1}}^3} p^{\frac{3}{2}} (E(\|X_1\|^2 I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r)))^{\frac{3}{2}} \\
 &\leq \sum_{r=1}^{\infty} \frac{C \beta^{r+1} p^{\frac{3}{2}}}{p a_{n_{r+1}}^3} (E(\|X_1 I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r)))^{\frac{3}{2}} \\
 &\leq \sum_{r=1}^{\infty} \frac{C \beta^{r+1} p^{\frac{1}{2}} (LL \tau_r)^{\frac{3}{2}}}{\beta^{\frac{3(r+1)}{2}} (LL \beta^{r+1})^{\frac{3}{2}}} \left( E \left( \frac{\|X_1\|^2}{LL \|X_1\|} I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r) \frac{LL \|X_1\|}{LL \tau_r} \right)^{\frac{3}{2}} \right) \\
 &\leq \sum_{r=1}^{\infty} \frac{C}{r^{\frac{3}{2}}} \left( E \left( \frac{\|X_1\|^2}{LL \|X_1\|} I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r) \frac{LL \|X_1\|}{LL \tau_r} \right) \right)^{\frac{3}{2}}.
 \end{aligned}$$

Из (2.6) вытекает сходимость последнего ряда.

Теперь оценим слагаемое I (ниже  $\psi(x) = \log_{\beta} x$ ):

$$\begin{aligned}
 I &= \sum_{r=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{m(\lfloor \beta^{r+1} \rfloor)} \frac{C}{a_{n_{r+1}}^3} \left( \sum_{j=(p+q)(i-1)+1}^{(p+q)(i-1)+p} E \|X_1 I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r) \right. \\
 &\quad \left. - E X_1 I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r) \right)^3 \leq \sum_{r=1}^{\infty} \frac{C \beta^{r+1} p}{p a_{n_{r+1}}^3} E(\|X_1\|^3 I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r)) \\
 &\leq \sum_{r=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{a_{n_{r+1}}^2} \frac{k^{\frac{3}{2}} P(k-1 \leq \|X_1\|^2 \leq k)}{\beta^{\frac{r\alpha}{2}} (LL \beta^r)^{\frac{3}{2}}} \\
 &\leq C \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{r \geq \psi(\frac{k}{4LLk})-1} \frac{k^{\frac{3}{2}} P(k-1 \leq \|X_1\|^2 \leq k)}{\beta^{\frac{r\alpha}{2}} (LL \beta^r)^{\frac{3}{2}}} \\
 &\leq C \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^{\frac{3}{2}} P(k-1 \leq \|X_1\|^2 \leq k)}{(\frac{k}{LLk})^{1/2} (LL(\frac{k}{LLk}))^{\frac{3}{2}}} \\
 &\leq C \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{LLk} P(k-1 \leq \|X_1\|^2 \leq k) \leq CE \left( \frac{\|X_1\|^2}{LL \|X_1\|} \right) < \infty.
 \end{aligned}$$

Для установления (2.9) остается доказать, что

$$\sum_{r=1}^{\infty} E \left( g \left( \sum_{i=1}^{m(\lfloor \beta^{r+1} \rfloor)} G_i / a_{n_{r+1}} \right) \right) < \infty. \quad (2.11)$$

Имеем

$$\begin{aligned} Eg\left(\sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} G_i/a_{n_{r+1}}\right) &\leq E\left(I\left(\left\|\sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} G_i/a_{n_{r+1}}\right\| > \Gamma + \frac{\varepsilon}{8}\right)\right) \\ &= P\left(\left\|\sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} G_i/a_{n_{r+1}}\right\| > \Gamma + \frac{\varepsilon}{8}\right). \end{aligned}$$

Покажем, что

$$\sum_{r=1}^{\infty} P\left(\left\|\sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} G_i/a_{n_{r+1}}\right\| > \Gamma + \frac{\varepsilon}{8}\right) < \infty. \quad (2.12)$$

Для гауссовской с.в.  $G$  в  $H$  имеет место равенство (доказательство см. [2, с. 116])

$$P(\|G\| > t) = \exp\left\{\frac{(1-\delta)}{\delta\Lambda} E\|G\|^2 - \frac{(1-\delta)}{\Lambda} t^2\right\}, \quad \text{где } \delta > 0, \Lambda = 2 \sup_{\|f\| \leq 1} Ef^2(G).$$

Теперь берем

$$G = \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \frac{G_i}{\sqrt{n_{r+1}}}, \quad t = \left(\Gamma + \frac{\varepsilon}{8}\right) \sqrt{2LLn_{r+1}}.$$

Тогда  $\Gamma_r = (\Lambda_r/2)^{1/2}$  и  $E\|G\|^2 = o(LLn_{r+1})$ , так как

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow \infty} E\left\|\sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} G_i/a_{n_{r+1}}\right\|^2 &\leq \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{a_{n_{r+1}}^2} \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} E\|G_i\|^2 \\ &\leq \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{a_{n_{r+1}}^2} \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} E\|\xi_i\|^2 \leq \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{C\beta^{r+1}p}{pa_{n_{r+1}}^2} E(\|X_1\|^2 I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r)) \\ &\leq C \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{E(\|X_1\|^2 I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r))}{LLn_{r+1}} \\ &= C \lim_{r \rightarrow \infty} E\left(\frac{\|X_1\|^2}{LL\|X_1\|} I(\|X_1\|^2 \leq \tau_r) \frac{LL\|X_1\|}{LLn_{r+1}}\right) = 0. \end{aligned}$$

Выше мы использовали следующий факт о сходимости вторых моментов в центральной предельной теореме (см. [19]):

$$E\|G_i\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} E\|(y_{i1} + \dots + y_{in})/\sqrt{n}\|^2 = E\|y_{i1}\|^2 = E\|\xi_i\|^2,$$

где  $\{y_{ik} : k \geq 1\}$  — независимые копии  $y_i$ .

Теперь покажем, что  $\Gamma_r \rightarrow \Gamma$  при  $r \rightarrow \infty$ . Напомним, что

$$\begin{aligned} \Gamma_r &= \left(\sup_{\|f\| \leq 1} Ef^2(G)\right)^{1/2} = \sup_{\|f\| \leq 1} \left(Ef^2\left(\sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} G_i/\sqrt{n_{r+1}}\right)\right)^{1/2}, \\ \Gamma &= \sup_{\|f\| \leq 1} (T(f, f))^{1/2} = \sup_{\|f\| \leq 1} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{Ef^2(S_n)}{n}\right)^{1/2}. \end{aligned}$$

Докажем следующее соотношение:

$$\left|Ef^2\left(\sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} G_i/\sqrt{n_{r+1}}\right) - \frac{Ef^2(S_{n_{r+1}})}{n_{r+1}}\right| \rightarrow 0 \quad \text{при } r \rightarrow \infty. \quad (2.13)$$

В силу независимости  $\{G_i, i \geq 1\}$  и того факта, что  $G_i$  и  $y_i$  имеют одинаковый ковариационный оператор, получим

$$\begin{aligned} Ef^2\left(\sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} G_i/\sqrt{n_{r+1}}\right) &= \frac{1}{n_{r+1}} \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} Ef^2(G_i) \\ &= \frac{1}{n_{r+1}} \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} Ef^2(y_i) = \frac{1}{n_{r+1}} \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} Ef^2(\xi_i). \end{aligned} \quad (2.14)$$

Теперь докажем, что при  $r \rightarrow \infty$

$$\left| \frac{1}{n_{r+1}} \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} Ef^2(\xi_i) - \frac{1}{n_{r+1}} Ef^2\left(\sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \xi_i\right) \right| \rightarrow 0. \quad (2.15)$$

Используем следующую лемму, которая является частным случаем более общих результатов С. А. Утева [16].

**Лемма 6.** Для центрированной последовательности с.в.  $\{X_n, n \geq 1\}$  со значениями в гильбертовом пространстве имеет место следующее неравенство:

$$\left| \sum_{\substack{i,j=1 \\ |i-j|>1}}^n E\langle X_i, X_j \rangle \right| \leq C \exp\left(\sum_{j=0}^{[\log_2 n]} \varphi^{1/2}(2^{j/3})\right) \sum_{j=0}^{[\log_2 n]} \varphi^{1/2}(2^{j/3}) \sum_{j=1}^n E\|X_j\|^2,$$

здесь  $C$  — абсолютная константа.

Используя лемму 6 для одномерных с.в.  $f(\xi_i)$ , а также лемму 3 и условие (1.5), получим

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{n_{r+1}} \left( \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} Ef^2(\xi_i) - Ef^2\left(\sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \xi_i\right) \right) \right| &= \left| \frac{1}{n_{r+1}} \left( \sum_{\substack{i,j=1 \\ |i-j|>1}}^n Ef(\xi_i)f(\xi_j) \right) \right| \\ &\leq \frac{C}{n_{r+1}} \exp\left(2C \frac{\log_2 r}{r^2}\right) \frac{\log_2 r}{r^2} \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} Ef^2(\xi_i) \\ &\leq \frac{C \exp\left(2C \frac{\log_2 r}{r^2}\right) \log_2 r}{\beta^r r^2} \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} Ef^2\left(\sum_{j=(p+q)(i-1)+1}^{(p+q)(i-1)+p} u_j\right) \\ &\leq \frac{C \exp\left(2C \frac{\log_2 r}{r^2}\right) \log_2 r}{\beta^r r^2} r^\gamma p Ef^2(u_{(p+q)(m([\beta^{r+1}])-1)+p}) \\ &\leq \frac{C \log_2 r}{r^2} Ef^2(u_{(p+q)(m([\beta^{r+1}])-1)+p}) \rightarrow 0 \quad \text{при } r \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Теперь покажем, что при  $r \rightarrow \infty$

$$\frac{1}{n_{r+1}} \left| Ef^2\left(\sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \xi_i\right) - Ef^2\left(\sum_{i=1}^{n_{r+1}} u_i\right) \right| \rightarrow 0. \quad (2.16)$$

Имеем

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{n_{r+1}} \left( Ef^2 \left( \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \xi_i \right) - Ef^2 \left( \sum_{i=1}^{n_{r+1}} u_i \right) \right) \right| \\ &= \left| \frac{1}{n_{r+1}} \left( Ef^2 \left( \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \xi_i \right) - Ef^2 \left( \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \xi_i + \sum_{i=1}^k \eta_i + U_0 \right) \right) \right| \\ &= \left| \frac{1}{n_{r+1}} \left( Ef^2 \left( \sum_{i=1}^k \eta_i \right) + Ef^2(U_0) + 2Ef \left( \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \xi_i \right) f \left( \sum_{i=1}^k \eta_i \right) \right. \right. \\ & \quad \left. \left. + 2Ef \left( \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \xi_i \right) f(U_0) + 2Ef \left( \sum_{i=1}^k \eta_i \right) f(U_0) \right) \right|. \end{aligned}$$

Сходимость последнего выражения к нулю вытекает из следующих пяти соотношений:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n_{r+1}} Ef^2 \left( \sum_{i=1}^k \eta_i \right) &\leq \frac{C}{n_{r+1}} \sum_{i=1}^n Ef^2(\eta_i) \leq \frac{Ck \cdot q}{n_{r+1}} Ef^2(u_{(p+q)k}) \\ &\leq \frac{Cr^\gamma \beta^{\alpha r}}{\beta^{r+1}} Ef^2(u_{(p+q)k}) \rightarrow 0 \quad \text{при } r \rightarrow \infty; \end{aligned}$$

$$\frac{1}{n_{r+1}} Ef^2(U_0) \leq \frac{C \cdot p}{n_{r+1}} Ef^2(u_{n_{r+1}}) \leq \frac{C \frac{\beta^r}{r^\gamma}}{\beta^{r+1}} Ef^2(u_{n_{r+1}}) \rightarrow 0 \quad \text{при } r \rightarrow \infty;$$

$$\begin{aligned} & \left| \frac{2}{n_{r+1}} Ef \left( \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \xi_i \right) f \left( \sum_{i=1}^k \eta_i \right) \right| \\ &\leq \frac{2}{n_{r+1}} \left( Ef^2 \left( \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \xi_i \right) \right)^{1/2} \left( Ef^2 \left( \sum_{i=1}^k \eta_i \right) \right)^{1/2} \\ &\leq \frac{C \sqrt{m([\beta^{r+1}])} p \sqrt{kq}}{n_{r+1}} \leq \frac{C \sqrt{r^\gamma \frac{\beta^r}{r^\gamma} r^\gamma \beta^{\alpha r}}}{\beta^{r+1}} \rightarrow 0 \quad \text{при } r \rightarrow \infty; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \left| \frac{2}{n_{r+1}} Ef \left( \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \xi_i \right) f(U_0) \right| \\ &\leq \frac{2}{n_{r+1}} \left( Ef^2 \left( \sum_{i=1}^{m([\beta^{r+1}])} \xi_i \right) \right)^{1/2} \left( Ef^2(U_0) \right)^{1/2} \\ &\leq \frac{C \sqrt{r^\gamma \frac{\beta^r}{r^\gamma}} \sqrt{\frac{\beta^r}{r^\gamma}}}{\beta^r} \rightarrow 0 \quad \text{при } r \rightarrow \infty; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \left| \frac{2}{n_{r+1}} Ef \left( \sum_{i=1}^k \eta_i \right) f(U_0) \right| \leq \frac{2}{n_{r+1}} \left( Ef^2 \left( \sum_{i=1}^k \eta_i \right) \right)^{1/2} \left( Ef^2(U_0) \right)^{1/2} \\ &\leq \frac{C \sqrt{r^\gamma \beta^{\alpha r}} \sqrt{\frac{\beta^r}{r^\gamma}}}{\beta^r} \rightarrow 0 \quad \text{при } r \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Остается доказать, что при  $r \rightarrow \infty$

$$\left| \frac{1}{n_{r+1}} \left( Ef^2 \left( \sum_{i=1}^{n_{r+1}} u_i \right) - Ef^2(S_{n_{r+1}}) \right) \right| \rightarrow 0. \quad (2.17)$$

Имеем

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{n_{r+1}} \left( Ef^2 \left( \sum_{i=1}^{n_{r+1}} u_i \right) - Ef^2(S_{n_{r+1}}) \right) \right| \\ &= \left| \frac{1}{n_{r+1}} \left( Ef^2 \left( \sum_{i=1}^{n_{r+1}} u_i \right) - Ef^2(U_{n_{r+1}} + W_{n_{r+1}}) \right) \right| \\ &= \frac{1}{n_{r+1}} |Ef^2(W_{n_{r+1}}) + Ef(U_{n_{r+1}})f(W_{n_{r+1}})|. \end{aligned}$$

Из леммы 3 следует, что

$$\frac{1}{n_{r+1}} Ef^2(W_{n_{r+1}}) \leq \frac{C}{n_{r+1}} \sum_{i=1}^{n_{r+1}} Ef^2(w_i). \quad (2.18)$$

Так как  $Ef^2(w_{n_{r+1}}) \rightarrow 0$  при  $r \rightarrow \infty$ , то из известной леммы Теплица вытекает, что при  $r \rightarrow \infty$

$$\frac{1}{n_{r+1}} \sum_{i=1}^{n_{r+1}} Ef^2(w_i) \rightarrow 0. \quad (2.19)$$

Далее,

$$\begin{aligned} \frac{1}{n_{r+1}} |Ef(U_{n_{r+1}})f(W_{n_{r+1}})| &\leq \frac{1}{n_{r+1}} (Ef^2(U_{n_{r+1}}))^{1/2} (Ef^2(W_{n_{r+1}}))^{1/2} \\ &\leq \frac{C\sqrt{n_{r+1}}(Ef^2(W_{n_{r+1}}))^{1/2}}{n_{r+1}} \leq C \left( \frac{Ef^2(W_{n_{r+1}})}{n_{r+1}} \right)^{1/2} \rightarrow 0 \quad \text{при } r \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Сходимость к нулю последнего выражения получим из (2.18), (2.19).

Таким образом, из (2.14)–(2.17) вытекает (2.13), что, в свою очередь, влечет сходимость  $\Gamma_r \rightarrow \Gamma$  при  $r \rightarrow \infty$ . Имея это в виду и выбирая  $\delta > 0$  таким, чтобы для достаточно больших  $r$  выполнялось

$$\frac{(1-\delta)(\Gamma + \frac{\varepsilon}{8})^2}{2\Gamma^2} > \frac{1}{2},$$

заключаем, что существует  $\eta > 0$  такое, что для достаточно больших  $r$

$$P \left( \left\| \sum_{j=1}^{m(\lfloor \beta^{r+1} \rfloor)} G_j / \sqrt{n_{r+1}} \right\| > \left( \Gamma + \frac{\varepsilon}{8} \right) \right) \leq \exp\{-(1+\eta)LLn_{r+1}\},$$

откуда следует (2.12). Итак, мы доказали (2.9), и доказательство достаточности условий теоремы закончено.

**НЕОБХОДИМОСТЬ.** Из  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\|S_n\|}{a_n} < \infty$  п. н. вытекает существование константы  $A$  такой, что

$$P(\|X_n/a_n\| > A \text{ бесконечно часто}) = 0. \quad (2.20)$$

Следующая лемма является непосредственным следствием результатов из [20].

**Лемма 7.** Для последовательности  $\{X_n, n \geq 1\}$   $\varphi$ -перемешивающихся с.в. со значениями в  $H$  из (2.20) вытекает соотношение

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(\|X_n/a_n\| > A) < \infty.$$

Используя одинаково распределенность и лемму 7, имеем

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(\|X_n/a_n\| > A) = \sum_{n=1}^{\infty} P(\|X_1\| > Aa_n) < \infty.$$

Сходимость последнего ряда эквивалентна условию (1.7).

Доказательство теоремы 1 закончено.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 2. НЕОБХОДИМОСТЬ.** Так как из КЗПЛ следует ОЗПЛ, необходимость условия (1.7) вытекает из теоремы 1.

**ДОСТАТОЧНОСТЬ.** Мы должны доказать, что существует компактное множество  $K \subset H$  такое, что

$$C\left(\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}\right) = K \quad \text{п. н.}, \tag{2.21}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{S_n}{a_n} - K \right\| = 0 \quad \text{п. н.} \tag{2.22}$$

В качестве  $K$  возьмем единичный шар гильбертова пространства  $H_\mu$ , построенного по вероятностной мере  $\mu$  с ковариационной функцией  $T(f, g)$  по лемме 1. Условие (1.8) влечет компактность множества  $K$ . Сначала докажем (2.22). Ковариационный оператор, соответствующий ковариационной функции  $T(f, g)$ , обозначим через  $T$ .

Имеет место следующая

**Лемма 8 [2].**  $T$  является ограниченным симметричным неотрицательно определенным оператором, и

$$T^{1/2}(V) = K,$$

где  $V = \{x \in H : \|x\| = (\langle x, x \rangle)^{1/2} \leq 1\}$ .

Пусть  $\varepsilon > 0$  и  $I$  — тождественный оператор в  $H$  (т. е.  $I(x) = x$ ). Тогда существует оператор  $(T^{1/2} + \varepsilon I)^{-1}$  и он ограничен. Положим

$$q(x) = \|(T^{1/2} + \varepsilon I)^{-1}(x)\| = (\langle (T^{1/2} + \varepsilon I)^{-1}(x), (T^{1/2} + \varepsilon I)^{-1}(x) \rangle)^{1/2}. \tag{2.23}$$

Рассмотрим гильбертово пространство  $H$  с нормой  $q(\cdot)$  (которая определена через скалярное произведение). Для пространства  $(H, q)$  имеет место теорема 1, и из (2.3) имеем

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} q(S_n/a_n) \leq \sup_{x \in K} q(x) \quad \text{п. н.} \tag{2.24}$$

Из леммы 8 получим

$$\begin{aligned} \sup_{x \in K} q(x) &= \sup_{x \in K} \|(T^{1/2} + \varepsilon I)^{-1}(x)\| = \sup_{y \in V} \|(T^{1/2} + \varepsilon I)^{-1}T^{1/2}(y)\| \\ &= \|(T^{1/2} + \varepsilon I)^{-1}T^{1/2}\|, \end{aligned} \tag{2.25}$$

где  $\|\cdot\|$  означает норму оператора.

Обозначим  $U = T^{1/2} + \varepsilon I$ . В [2, с. 119] доказано, что

$$\langle x, x \rangle \geq \langle U^{-1}T^{1/2}(x), U^{-1}T^{1/2}(x) \rangle. \quad (2.26)$$

Из соотношений (2.24)–(2.26) следует

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} q\left(\frac{S_n}{a_n}\right) \leq 1 \quad \text{п. н.} \quad (2.27)$$

Так как  $q(x) \leq 1$  тогда и только тогда, когда  $(T^{1/2} + \varepsilon I)^{-1}(X) = y$  для некоторого  $y \in V$ , по лемме 8

$$\{x : q(x) \leq 1\} \leq K + \varepsilon V. \quad (2.28)$$

Из (2.27) и (2.28) имеем

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{S_n}{a_n} - K \right\| \leq \varepsilon \quad \text{п. н.,}$$

откуда в силу произвольности  $\varepsilon$  получим (2.22). Остается доказать (2.21). Используем следующие леммы.

**Лемма 9.** Пусть  $H_\mu$  — гильбертово пространство, построенное по вероятностной мере  $\mu$  на  $H$ , с нулевым средним и непрерывной в  $*$ -слабой топологии ковариационной функцией  $T(f, g)$  по лемме 1. Далее, пусть для последовательности с.в.  $\{X_n, n \geq 1\}$  со значениями в  $H$  выполнено следующее условие:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{f(S_n)}{a_n} = \sup_{x \in K} f(x) \quad \text{п. н. для всех } f \in H^*,$$

где  $K$  — единичный шар  $H_\mu$ . Тогда

1) если  $\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$  п. н. относительно компактна, то

$$C\left(\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}\right) = K \quad \text{п. н.}$$

2)  $\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$  п. н. относительно компактна тогда и только тогда, когда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{S_n}{a_n} - K \right\| = 0 \quad \text{п. н.}$$

**Лемма 10.** Пусть  $\{\xi_i, i \geq 1\}$  — последовательность одномерных одинаково распределенных с.в., удовлетворяющих следующим условиям:

$$E\xi_i = 0, \quad E\xi_i^2 < \infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} E(\xi_1 + \dots + \xi_n)^2 = \sigma < \infty, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \varphi^{1/2}(2^k) < \infty.$$

Тогда

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{a_n} = \sigma.$$

Лемма 9 есть частный случай результата, доказанного в [5] (см. теорему 3.1). При этом теорема 3.1 из [5] доказана при условии, что  $\int_H \|x\|^2 d\mu(x) < \infty$  (очевидно, это условие сильнее, чем сформулированное в лемме). Это условие нужно было только для того, чтобы обеспечить множеству  $K$  компактность. Но из леммы 1 следует, что условие (1.8) обеспечивает компактность множества  $K$ .

Поэтому доказательство теоремы 3.1 из [5] сохраняется и для леммы 9. Этот факт был замечен в [1]. В [5] (теорема 3.1) п. 1 леммы 9 был доказан при предположении, что  $H_\mu$  бесконечномерно. Но утверждение п. 1 можно доказать (с учетом леммы 10 вместо соотношения (2.2) из [13]) и без этого предположения, как это сделано в [13, предложение 1, с. 703] для случая  $m$ -зависимых с.в.

Лемма 10 является следствием теоремы 3.1 из [16]. Хотя на самом деле в [16] предполагается, что  $\sigma > 0$ . Но рассуждения, обосновывающие замечание о достаточности доказательства соотношения (2.3) при условии  $\Gamma > 0$ , применимы и по отношению к лемме 10. Следовательно, утверждение леммы остается верным и при  $\sigma = 0$ .

По лемме 10 имеем

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{f(S_n)}{a_n} = \left( \int_H f^2(y) d\mu(y) \right)^{\frac{1}{2}} \quad \text{п. н.}$$

Из леммы 1 следует

$$\sup_{x \in K} f(x) = \left( \int_H f^2(y) d\mu(y) \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Таким образом, условие леммы 9 выполнено, и если иметь в виду ранее доказанное (2.22), то по лемме 9 получим (2.21). Теорема 2 доказана.

Автор выражает искреннюю благодарность рецензенту за полезные замечания и предложения, которые способствовали существенному улучшению первоначального варианта статьи.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Goodman V., Kuelbs J., Zinn J. Some results on the LIL in Banach space with applications to weighted empirical processes // Ann. Probab. 1981. V. 9, N 5. P. 713–752.
2. Acosta A., Kuelbs J. Some results on the cluster sets  $C(\{S_n/a_n\})$  and the LIL // Ann. Probab. 1983. V. 11, N 1. P. 102–105.
3. Ledoux M., Talagrand M. Probability in Banach spaces. Berlin: Springer-Verl., 1991.
4. Ledoux M., Talagrand M. Characterization of the law of the iterated logarithm in Banach spaces // Ann. Probab. 1988. V. 16, N 3. P. 1241–1264.
5. Kuelbs J. A strong convergence theorem for Banach space valued random variables // Ann. Probab. 1976. V. 4, N 5. P. 744–771.
6. Chen X. On the law of the iterated logarithm for independent Banach space valued random variables // Ann. Probab. 1993. V. 21, N 4. P. 1991–2011.
7. Chen X. On Strassen's law of the iterated logarithm in Banach space // Ann. Probab. 1994. V. 22, N 2. P. 1026–1043.
8. Einmahl U. On the cluster set problem for the generalized law of the iterated logarithm in Euclidean space // Ann. Probab. 1995. V. 23, N 2. P. 817–851.
9. Kuelbs J., Philipp W. Almost sure invariance principles for partial sums of mixing  $B$ -valued random variables // Ann. Probab. 1980. V. 8, N 6. P. 1003–1036.
10. Dehling H., Philipp W. Almost sure invariance principles for weakly dependent vector-valued random variables // Ann. Probab. 1982. V. 10, N 3. P. 689–701.
11. Philipp W. Invariance principles for independent and weakly dependent random variables // Dependence in Probability and Statistics (Proc. Conf. Oberwolfach. 1985). Boston; Basel; Stuttgart: Birkhauser, 1986. P. 225–268.
12. Шарипов О. III. Законы повторного логарифма и почти наверное принцип инвариантности для слабозависимых случайных величин со значениями в гильбертовом пространстве. Деп. ВИНТИ. 1991. Деп № 3493–В91. 29 с.
13. Chen X. The law of the iterated logarithm for  $m$ -dependent Banach space valued random variables // J. Theor. Probab. 1997. V. 10, N 3. P. 695–732.

14. Beck A., Warren P. Weak orthogonality // Pacific J. Math. 1972. V. 41, N 1. P. 1–11.
15. Вахания Н. Н., Тариеладзе В. И., Чобаян С. А. Вероятностные распределения в банаховых пространствах. М.: Наука, 1985.
16. Утев С. А. Суммы случайных величин с  $\phi$ -перемешиванием // Тр. Ин-та Математики СО АН СССР. 1989. Т. 13. С. 78–100.
17. Iosifescu M., Theodorescu R. Random processes and learning. Berlin: Springer, 1969.
18. Berkes I., Philipp W. Approximation theorems for independent and weakly dependent random vectors // Ann. Probab. 1979. V. 7, N 1. P. 29–54.
19. Круглов В. М. Сходимость числовых характеристик сумм независимых случайных величин со значениями в гильбертовом пространстве // Теория вероятностей и ее применения. 1973. Т. 18, № 4. С. 734–752.
20. Cohn H. On a class of dependent random variables // Rev. Roum. Math. Pures et Appl. 1965. V. 10. P. 1593–1606.

*Статья поступила 4 января 2003 г.*

*Шарипов Олимжон Шукурович  
Институт математики им. В. И. Романовского АН РУз,  
ул. Ф. Ходжаева, 29, Ташкент 700143, Узбекистан  
root@im.tashkent.su*