

УДК 517.51

КЛАССЫ ФУНКЦИЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ  
С ПОМОЩЬЮ ЛОКАЛЬНЫХ  
ПРИБЛИЖЕНИЙ РЕШЕНИЯМИ  
ГИПОЭЛЛИПТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

А. В. Покровский

**Аннотация:** В терминах локальных аппроксимаций в интегральных метриках решениями уравнения  $P(D)f = 0$ , где  $P(D)$  — квазиоднородный гипоеллиптический линейный дифференциальный оператор с постоянными коэффициентами, описаны анизотропные функциональные классы типа Кампанато — Морри.

**Ключевые слова:** квазиоднородный гипоеллиптический оператор, локальные аппроксимации, классы Кампанато — Морри, модуль непрерывности, функция растяжения.

Введение

Пусть  $G$  — область в  $\mathbb{R}^n$  или на комплексной плоскости  $\mathbb{C}$ ,  $P(D)$  — однородный эллиптический линейный дифференциальный оператор с постоянными (вообще говоря, комплексными) коэффициентами в  $G$  порядка  $m > 0$ ,  $h(t)$  — положительная неубывающая функция аргумента  $t \in (0, +\infty)$ . Рассмотрим множество  $U_1(P(D), G, h)$  всех функций  $f \in L(G)_{\text{loc}}$ , обладающих свойством: существует такая неотрицательная величина  $C(f)$ , что для каждого замкнутого шара  $B(x, r) \subset G$  с центром в точке  $x$  и радиусом  $r$  найдется функция  $u$ , интегрируемая на этом шаре и удовлетворяющая внутри него равенству  $P(D)u = 0$ , для которой справедливо неравенство

$$\int_{B(x,r)} |f(y) - u(y)| dy \leq C(f)r^n h(r).$$

Такие функциональные классы возникают при изучении множеств неизолированных особых точек решений уравнения  $P(D)f = 0$ , а в случае, когда  $P(D)$  — оператор Коши — Римана в  $\mathbb{C}$ , и в теории моногенности (см. [1–5]). Так, например, Б. Ж. Ищановым [3] показано, что условие  $h(t) = o(t^m)$  при  $t \rightarrow 0$  обеспечивает совпадение класса  $U_1(P(D), G, h)$  с множеством всех решений уравнения  $P(D)f = 0$  в  $G$  (как обычно, две локально интегрируемые функции, различающиеся лишь на множестве лебеговой меры нуль в  $G$ , считаются равными). В настоящей работе мы исследуем случай, когда функция  $h(t)$  убывает к нулю (при  $t \rightarrow 0$ ) медленнее, чем  $o(t^m)$ . В частности, показывается, что при  $h(t) = t^s$ ,  $0 < s < m$ , каждая функция  $f \in U_1(P(D), G, h)$  локально в  $G$  принадлежит классу Гельдера — Зигмунда  $\Lambda^s$ , а в случае  $h(t) \equiv 1$  — классу  $ВМО$

функций с ограниченным средним колебанием. На самом деле мы рассматриваем в работе более широкий класс дифференциальных операторов с постоянными коэффициентами — квазиоднородные гипоэллиптические операторы (к ним принадлежит, например, оператор теплопроводности) — и устанавливаем для них результаты, аналогичные приведенным выше.

Основные результаты работы и их приложения к описанию замкнутых множеств неизолированных особых точек, устранимых для решений уравнения  $P(D)f = 0$ , изложены в заметке [6].

### 1. Определения и обозначения

Пусть  $M = (M_1, \dots, M_n)$  — вектор с натуральными компонентами,  $|M| = M_1 + \dots + M_n$ . Сопоставим каждому полиному с комплексными коэффициентами  $P(z)$  ( $z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$  ( $n \geq 1$ ),  $\mathbb{C}^1 =: \mathbb{C}$ ) линейный дифференциальный оператор  $P(D)$  с постоянными коэффициентами в  $\mathbb{R}^n$ , полученный заменой  $z_j$  на  $D_j := -i \frac{\partial}{\partial x_j}$  при каждом  $j = \overline{1, n}$  ( $i^2 = -1$ ). Полином  $P(z)$  (оператор  $P(D)$ ) называется  $M$ -однородным, если существует такое  $m \in \mathbb{N}_0 := \{0, 1, \dots\}$ , что

$$P(z) \equiv \sum_{|k \cdot M| = m} a_k z^k,$$

где  $k = (k_1, \dots, k_n)$ ,  $k_j \in \mathbb{N}_0$  ( $j = 1, \dots, n$ ),  $|k \cdot M| = k_1 M_1 + \dots + k_n M_n$ ,  $z^k = z_1^{k_1} \dots z_n^{k_n}$ . Для произвольного полинома  $P(z)$  его  $M$ -степеню  $\deg_M P$  называется наименьшее  $m$  такое, что  $P(z) \equiv \sum_{|k \cdot M| \leq m} a_k z^k$ . Как обычно, опе-

ратор  $P(D)$  называется квазиоднородным, если он  $M$ -однороден при некотором натуральном векторе  $M$ .

Напомним (см., например, [7, с. 75]), что оператор  $P(D)$  называется гипоэллиптическим, если для любых области  $G \subset \mathbb{R}^n$  и функции  $f \in C^\infty(G)$  каждое обобщенное решение уравнения  $P(D)g = f$  является функцией класса  $C^\infty(G)$ . Здесь, как обычно,  $C^\infty(G)$  — пространство всех функций, бесконечно дифференцируемых в области  $G$  (в настоящей работе мы рассматриваем функции, принимающие, вообще говоря, комплексные значения), обобщенные решения понимаются в смысле распределений по Л. Шварцу, каждая функция  $f \in C^\infty(G)$  естественным образом отождествляется с распределением. Существуют эффективно проверяемые условия на полином  $P = P(z)$ , необходимые и достаточные для того, чтобы соответствующий ему оператор  $P(D)$  был гипоэллиптическим. Приведем одно из них [7, с. 75]: расстояние от точки  $x = (x_1 + i0, \dots, x_n + i0) \in \mathbb{C}^n$  ( $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ ) до множества  $\{z \in \mathbb{C}^n : P(z) = 0\}$  стремится к  $\infty$  при  $|x| \rightarrow \infty$ . Из этого критерия вытекает, что  $M$ -однородный оператор  $P(D)$  является гипоэллиптическим тогда и только тогда, когда  $P(x) \neq 0$  при всех  $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ , и, следовательно, принадлежит подклассу гипоэллиптических операторов, называемых полуэллиптическими (или квазиэллиптическими), введенных Л. Р. Волевичем в работе [8] (см. также [7, с. 84]).

Всюду ниже  $P(D)$  —  $M$ -однородный гипоэллиптический линейный дифференциальный оператор с постоянными коэффициентами в  $\mathbb{R}^n$  ( $n \geq 2$ ),  $m = \deg_M P \geq 1$ .

Для всех  $r \geq 0$  и  $t = (t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^n$  полагаем

$$r^M \cdot t := (r^{M_1} t_1, \dots, r^{M_n} t_n), \quad r^{-M} \cdot t := (r^{-M_1} t_1, \dots, r^{-M_n} t_n).$$

Замкнутым  $M$ -шаром с центром  $x \in \mathbb{R}^n$  и радиусом  $r \geq 0$  называется множество  $B_M(x, r) := \{x + r^M \cdot t : \|t\| \leq 1\}$ , где  $\|t\| := (t_1^2 + \dots + t_n^2)^{1/2}$ . Если

$M = (1, \dots, 1)$ , то  $B_M(x, r) =: B(x, r)$ ,  $B(0, 1) =: B$ . Через  $C_0^\infty(B)$  обозначается множество всех функций  $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ , носитель которых содержится в  $B$ .

Пусть  $\rho \in C_0^\infty(B)$ ,  $\int_B \rho(t) dt = 1$ . Будем говорить, что  $(M, \rho)$ -регуляризация сохраняет решения уравнения  $P(D)f = 0$ , если для любой области  $G \subset \mathbb{R}^n$  каждая функция  $u \in C^\infty(G)$ , являющаяся в  $G$  решением этого уравнения, удовлетворяет равенству

$$\int u(x + r^M \cdot t) \rho(t) dt = u(x) \quad (1)$$

при всех  $x \in G$  и  $r > 0$  таких, что  $B_M(x, r) \subset G$ . Если в дополнение к этому из выполнения (1) при всех указанных выше  $x$  и  $r$  следует, что  $u$  — решение уравнения  $P(D)f = 0$  в  $G$ , то мы говорим, что  $(M, \rho)$ -регуляризация характеризует решения уравнения  $P(D)f = 0$ . Нам потребуется следующий результат работы [9]: для каждого  $M$ -однородного гипоеллиптического линейного дифференциального оператора  $P(D)$  с постоянными коэффициентами существует такая функция  $\rho \in C_0^\infty(B)$ , что  $(M, \rho)$ -регуляризация характеризует решения уравнения  $P(D)f = 0$ .

Всюду далее, за исключением обозначения  $C(G)$ , под которым понимается, как обычно, пространство всех непрерывных функций в области  $G$ , выражения вида  $C(\alpha, \beta, \dots)$  и  $C = C(\alpha, \beta, \dots)$  обозначают неотрицательные величины, зависящие только от  $\alpha, \beta$  и т. д., при этом в разных формулах величины с одним и тем же обозначением, вообще говоря, различны между собой.

Перейдем к определению рассматриваемых в работе функциональных классов. Пусть для каждой области  $G \subset \mathbb{R}^n$  задан некоторый класс  $H(G)$  функций, определенных в этой области, при этом если  $G_1 \subset G_2$  и  $f \in H(G_2)$ , то сужение функции  $f$  на  $G_1$  принадлежит классу  $H(G_1)$  для любых областей  $G_1, G_2 \subset \mathbb{R}^n$  (используя терминологию, предложенную в работе [5], будем говорить, что  $H$  является монотонным функциональным классом; отметим, что в [5] это понятие продуктивно использовано в задачах теории моногенности). Тогда через  $H(G)_{\text{loc}}$  мы обозначаем множество всех функций  $f$ , определенных в области  $G$ , обладающих свойством: для любой точки  $x \in G$  существует такая область  $G_x \subset G$ , содержащая  $x$ , что сужение  $f$  на  $G_x$  принадлежит классу  $H(G_x)$ .

Пусть  $G$  — область в  $\mathbb{R}^n$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ . Как обычно,  $L_p(G)$  — пространство всех комплекснозначных функций  $f$ , интегрируемых по Лебегу в степени  $p$  (существенно ограниченных при  $p = \infty$ ) в  $G$ . Норма  $\|f\|_{L_p(G)}$  функции  $f$  в этом пространстве задается равенствами

$$\|f\|_{L_p(G)} = \left( \int_G |f(x)|^p dx \right)^{1/p} \quad \text{при } p < \infty,$$

$$\|f\|_{L_\infty(G)} = \text{vrai sup}\{|f(x)| : x \in G\}.$$

Через  $\Phi_p$  мы обозначаем множество всех непрерывных положительных функций  $h(t)$ , определенных при  $0 < t \leq 1$ , таких, что функция  $t^{|M|/p}h(t)$  не убывает и  $t^{|M|/p}h(t) \rightarrow 0$  при  $t \rightarrow 0$  (если  $p = \infty$ , то полагаем  $1/p = 0$ ),  $\Phi_\infty =: \Phi$ .

Пусть  $h \in \Phi_p$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.** Через  $U_p(M, P(D), G, h)$  обозначается множество всех функций  $f \in L_p(G)_{\text{loc}}$ , обладающих свойством: существует не зависящая от  $x$  и  $r$  величина  $C(f) \geq 0$ , при которой для каждого  $M$ -шара  $B_M(x, r) \subset G$

с  $r \in (0, 1]$  найдется такая функция  $u \in L_p(B_M(x, r))$ , что  $P(D)u \equiv 0$  внутри  $B_M(x, r)$  и

$$\|f - u\|_{L_p(B_M(x, r))} \leq C(f)r^{|M|/p}h(r). \tag{2}$$

Пусть  $q \in \mathbb{N}_0$ . Заменяя в определении 1 условие « $P(D)u \equiv 0$  внутри  $B_M(x, r)$ » условием, что  $u$  — полином с  $\deg_M u \leq q$ , мы получаем определение анизотропных классов Кампонато  $C_p(M, q, G, h)$ . Если  $1 \leq p < \infty$ , то анизотропный класс Морри  $L_p(M, G, h)$  определяется как множество всех таких функций  $f \in L_p(G)_{\text{loc}}$ , что при некотором неотрицательном  $C = C(f)$  для каждого  $M$ -шара  $B_M(x, r) \subset G$  с  $r \in (0, 1]$  выполняется неравенство

$$\|f\|_{L_p(B_M(x, r))} \leq Cr^{|M|/p}h(r).$$

Частные случаи классов  $U_p(M, P(D), G, h)$ , в которых  $M = (1, 1)$ , а  $P(D)$  — оператор Коши — Римана в  $\mathbb{C}$ , впервые рассматривались в работах В. С. Федорова (см., например, [1]), в случае произвольных линейных дифференциальных операторов с достаточно гладкими коэффициентами эти классы введены Б. Ж. Ищановым [3]. По поводу результатов, относящихся к классам Кампонато и Морри, см., например, [10; 11, с. 396–435; 12–14] и ссылки в этих работах.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Пусть  $\rho \in C_0^\infty(B)$ ,  $\int_B \rho(t) dt = 1$ ,  $h \in \Phi$ . Через  $S(M, \rho, G, h)$  обозначается множество всех функций  $f \in C(G)$ , обладающих свойством: существует не зависящее от  $x$  и  $r$  неотрицательное  $C(f)$ , при котором

$$\left| \int_B f(x + r^M \cdot t)\rho(t) dt - f(x) \right| \leq C(f)h(r) \tag{3}$$

для всех таких  $x \in G$  и  $r \in (0, 1]$ , что  $B_M(x, r) \subset G$ .

Пусть  $\{e^1, \dots, e^n\}$  — стандартный базис в  $\mathbb{R}^n$ ,  $k \in \mathbb{N}$ ,  $j \in \{1, \dots, n\}$ ,  $f \in C(G)$ ,  $h \in \mathbb{R}$ . Положим

$$\Delta_k^j(h, G)f(x) := \sum_{l=0}^k (-1)^{k-l} \frac{k!}{l!(k-l)!} f(x + lhe^j)$$

при  $[x, x + khe^j] \subset G$ ,  $\Delta_k^j(h, G)f(x) := 0$  при  $[x, x + khe^j] \not\subset G$ . Как обычно, функцию  $\omega_k^j(f, G; t) := \sup_{-t \leq h \leq t} \|\Delta_k^j(h, G)f\|_{L_\infty(G)}$  ( $t > 0$ ) мы называем *модулем*

*непрерывности порядка  $k$  функции  $f$  в области  $G$  по направлению  $e^j$* . Вторым модулем непрерывности функции  $f$  называется функция  $\omega_2(f, G; t) := \sup\{|f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)| : x \in G, h \in \mathbb{R}^n, [x-h, x+h] \subset G, \|h\| \leq t\}$  ( $t \geq 0$ ). Если  $\omega_2(f, G; t) = O(t)$  при  $t \rightarrow 0$ , то говорим, что  $f$  удовлетворяет условию Зигмунда. Напомним также, что модулем непрерывности функции  $f$ , непрерывной на множестве  $E \subset \mathbb{R}^n$  ( $E \neq \emptyset$ ), называется определенная при  $t \geq 0$  функция  $\omega(t) = \omega(f, E; t) := \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in E, \|x - y\| \leq t\}$ . Если  $E$  — выпуклый компакт, то

$$0 = \omega(0) = \omega(0+) \leq \omega(t_1) \leq \omega(t_1 + t_2) \leq \omega(t_1) + \omega(t_2) \quad \forall t_1, t_2 \geq 0.$$

Непрерывная при  $t \geq 0$  функция  $\omega(t)$  называется *функцией типа модуля непрерывности*, если для нее выполняется последняя цепочка соотношений.

Как обычно,  $[s]$  и  $\{s\}$  — соответственно целая и дробная части действительного числа  $s = [s] + \{s\}$ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Пусть  $\alpha > 0$ . Анизотропным классом Гёльдера — Зигмунда  $\Lambda^{M,\alpha}(G)$  называется множество всех функций  $f \in C(G)$ , для которых  $\sup_{t>0} t^{-\alpha/M_j} \omega_{[\alpha/M_j]+1}^j(f, G; t) < \infty$ ,  $j = \overline{1, n}$ .

Отметим, что в случае  $M = (1, \dots, 1)$  принадлежность функции  $f$  классу  $\Lambda^{M,\alpha}(G)_{\text{loc}}$  равносильна тому, что при нецелом  $\alpha$  она  $[\alpha]$  раз непрерывно дифференцируема и все ее частные производные порядка  $[\alpha]$  удовлетворяют условию Гёльдера с показателем  $\{\alpha\}$  на компактных подмножествах области  $G$ , а при целом  $\alpha$  — тому, что  $f$  имеет непрерывные частные производные всех порядков  $\leq \alpha - 1$ , причем производные порядка  $\alpha - 1$  локально в  $G$  удовлетворяют условию Зигмунда (см, например, [11]).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4. Пусть  $\omega \in \Phi$ . Через  $\Lambda_\omega(G)$  обозначается множество всех функций  $f \in C(G)$ , удовлетворяющих условию

$$\sup_{t>0} (\omega(t))^{-1} \omega(f, G; t) < \infty.$$

Пусть  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $r > 0$  и  $f \in L_1(B_M(x, r))$ . Через  $E_p(M, P(D), f, x, r)$  обозначается величина

$$\inf_u \|f - u\|_{L_p(B_M(x, r))}, \quad (4)$$

где  $\inf$  берется по множеству всех функций  $u \in L_p(B_M(x, r))$ , удовлетворяющих равенству  $P(D)u = 0$  внутри  $M$ -шара  $B_M(x, r)$ . Используя  $M$ -однородность оператора  $P(D)$ , несложно проверить, что если  $\inf$  в (4) брать по множеству всех функций  $u$ , для каждой из которых равенство  $P(D)u = 0$  выполняется в некоторой (зависящей от  $u$ ) окрестности  $M$ -шара  $B_M(x, r)$ , то мы получим ту же самую величину. Пусть  $k \in \mathbb{N}_0$ . Величина, определенная формулой (4), в которой  $\inf$  берется по множеству всех полиномов  $u$  с  $\deg_M u \leq k$ , обозначается через  $E_{p,k}(M, f, x, r)$ .

Ниже в случае  $M = (1, \dots, 1)$  (в этом случае  $P(D)$  — однородный эллиптический оператор) мы будем опускать указание зависимости от  $M$  в обозначениях всех введенных выше величин. В частности, вместо  $U_p(M, P(D), G, h)$ ,  $C_p(M, q, G, h)$  и  $E_p(M, P(D), f, x, r)$  мы пишем соответственно  $U_p(P(D), G, h)$ ,  $C_p(q, G, h)$  и  $E_p(P(D), f, x, r)$ .

Как обычно, если  $\alpha \in \mathbb{R}$  и  $K, L \subset \mathbb{R}^n$ , то  $\alpha K = \{\alpha x : x \in K\}$  и  $K+L = \{x+y : x \in K, y \in L\}$ ;  $\overline{K}$ ,  $\partial K$  и  $K^0$  — замыкание, граница и множество внутренних точек множества  $K$  соответственно.

## 2. Вспомогательные результаты

Напомним, что положительная на отрезке  $(a, b) \subset \mathbb{R}$  ( $a < b$ ) функция  $h$  называется почти возрастающей (почти убывающей) на  $(a, b)$ , если существует постоянная  $C > 0$ , при которой для любых  $t_1, t_2 \in (a, b)$ ,  $t_1 \leq t_2$ , выполняется неравенство  $h(t_1) \leq Ch(t_2)$  ( $h(t_1) \geq Ch(t_2)$ ).

Пусть  $0 < a \leq \infty$ . Следуя [15, с. 75], сопоставим каждой положительной на интервале  $(0, a)$  функции  $h$  функцию  $R_{h,a}(s)$ ,  $s > 0$ , принимающую, возможно, значение  $+\infty$ , которая определена равенством  $R_{h,a}(s) := \sup_{\frac{h(t_1)}{h(t_2)}}$ , где супремум берется по всем таким  $t_1, t_2 \in (0, a)$ , что  $t_1 = st_2$ . Функция  $R_{h,a}(s)$  называется функцией растяжения функции  $h$  на интервале  $(0, a)$ . В дальнейшем рассматривается в основном случай  $a = 1$  и вместо  $R_{h,1}$  мы будем писать  $R_h$ .

**Лемма А.** Пусть функция  $h$  непрерывна, положительна и не убывает на интервале  $(0, a]$  ( $0 < a < \infty$ ). Тогда функция  $R_{h,a}$  полумультипликативна, т. е. при всех  $s_1, s_2 \in (0, a)$  выполняется неравенство  $R_{h,a}(s_1 s_2) \leq R_{h,a}(s_1) R_{h,a}(s_2)$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Продолжим функцию  $h$  на интервал  $(a, \infty)$ , полагая ее там равной  $h(a)$ . Легко видеть, что для продолженной функции, обозначаемой по-прежнему через  $h$ , при всех  $s \geq 1$  выполнено равенство  $R_{h,\infty}(s) = R_{h,a}(s)$ . Далее, очевидно, что при всех  $s_1, s_2 \in \mathbb{R}$  выполнено неравенство

$$R_{h,a}(s_1 s_2) \leq \sup_{0 < t < a} \frac{h(s_1 s_2 t)}{h(s_2 t)} \frac{h(s_2 t)}{h(t)}. \quad (5)$$

При  $s_1, s_2 \leq 1$  правая часть в (5) не превосходит  $R_{h,a}(s_1) R_{h,a}(s_2)$ , при  $s_1, s_2 \geq 1$  она не превосходит  $R_{h,\infty}(s_1) R_{h,\infty}(s_2) = R_{h,a}(s_1) R_{h,a}(s_2)$ . Если же  $s_1 \geq 1, s_2 < 1$ , то правая часть в (5) не превосходит  $R_{h,\infty}(s_1) R_{h,a}(s_2) = R_{h,a}(s_1) R_{h,a}(s_2)$ . Лемма доказана.

Следующие две леммы являются известными леммами работы [16], сформулированными в терминах функции растяжения.

**Лемма В.** Для каждой функции  $h \in \Phi$  следующие условия эквивалентны:

- 1)  $\int_0^u h(t) t^{-1} dt = O(h(u))$  при  $u \rightarrow 0$ ;
- 2)  $R_h(s_0) < 1$  при некотором  $s_0 < 1$ ;
- 3)  $R_h(s) = o(s)$  при  $s \rightarrow 0$ ;
- 4) существует такое  $\alpha \in (0, 1)$ , что функция  $h(t) t^{-\alpha}$  почти возрастает на  $(0, 1)$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Эквивалентность условий 2 и 3 вытекает из полумультипликативности функции  $R_h$ . В [16] показано, что каждое из условий 1 и 4 эквивалентно условию:

$$(L) \text{ существует такое } C > 1, \text{ что } \overline{\lim}_{t \rightarrow 0} \frac{h(Ct)}{h(t)} > 1.$$

Последнее означает, что  $R_{h,w}(C^{-1}) < 1$  при некотором  $w \in (0, 1)$ . Пусть  $H = \max\{C, w^{-1}\} > 1$ . Тогда  $R_h(H^{-2}) \leq R_{h,w}(C^{-1}) < 1$ , откуда получаем условие 2. С другой стороны, выполнение условия 2, очевидно, влечет за собой выполнение условия (L).

**Лемма С.** Пусть  $k \in \mathbb{N}$ . Тогда для каждой функции  $h \in \Phi$  следующие условия эквивалентны:

- 1)  $\int_0^1 h(t) t^{-k-1} dt = O(h(u) u^{-k})$  при  $u \rightarrow 0$ ;
- 2)  $R_h(s_0) < s_0^k$  при некотором  $s_0 > 1$ ;
- 3)  $R_h(s) = o(s^k)$  при  $s \rightarrow \infty$ ;
- 4) существует такое  $\alpha \in (0, k)$ , что функция  $h(t) t^{\alpha-k}$  почти убывает на  $(0, 1)$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Как и выше, эквивалентность условий 2 и 3 вытекает из полумультипликативности функции  $R_h(s)$ . В [16] доказана эквивалентность каждого из условий 1 и 4 леммы С условию:

$$(L_k) \text{ существует такое } C > 1, \text{ что } \overline{\lim}_{t \rightarrow 0} \frac{h(Ct)}{h(t)} < C^k.$$

Это значит, что при некотором  $w \in (0, 1)$  выполняется неравенство  $R_{h,w}(C) < C^k$ , следовательно,  $R_{h,w}(s) = o(s^k)$  при  $s \rightarrow \infty$ . Поскольку  $R_h(s) \leq \frac{h(1)}{h(w)} R_{h,w}(s)$  при всех  $s \geq 1$ , то  $R_h(s) = o(s^k)$  при  $s \rightarrow \infty$ . С другой стороны, выполнение условия 2, очевидно, влечет за собой выполнение условия  $(L_k)$ .

**Лемма D.** Пусть функция  $h$  непрерывна, положительна и не возрастает на интервале  $(0, 1]$ . Тогда следующие условия эквивалентны:

- 1)  $\int_u^1 h(t)t^{-1} dt = O(h(u))$  при  $u \rightarrow 0$ ;
- 2)  $R_h(s_0) < 1$  при некотором  $s_0 > 1$ ;
- 3)  $R_h(s) = o(1)$  при  $s \rightarrow \infty$ ;
- 4) существует такое  $\alpha \in (0, 1)$ , что функция  $h(t)t^\alpha$  почти убывает на  $(0, 1)$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Эквивалентность условий 2 и 3 проверяется элементарно. Установим равносильность условий 1 и 2. Пусть выполнено условие 2. Зафиксируем такое  $w > 1$ , что  $R_h(w) < 1$ , и пусть  $u \in (0, w^{-1})$ . Выберем  $k \in \mathbb{N}$  так, чтобы  $uw^k < 1 \leq uw^{k+1}$ . Тогда

$$\begin{aligned} \int_u^1 h(t)t^{-1} dt &\leq \sum_{j=0}^{k-1} \int_{uw^j}^{uw^{j+1}} h(t)t^{-1} dt + \int_{uw^k}^1 h(t)t^{-1} dt \leq \sum_{j=0}^k h(uw^j) \int_{uw^j}^{uw^{j+1}} t^{-1} dt \\ &= \ln w \sum_{j=0}^k h(uw^j) \leq \ln w \cdot h(u) \cdot (1 - R_h(w)) = O(h(u)) \quad (u \rightarrow 0). \end{aligned}$$

Обратно, пусть выполнено условие 1. Если  $u, uw \in (0, 1)$ ,  $w > 1$ , то

$$\ln w \cdot h(uw) \leq \int_u^{uw} h(t)t^{-1} dt \leq \int_u^1 h(t)t^{-1} dt \leq Ch(u)$$

для некоторой постоянной  $C > 0$ . Отсюда  $\frac{h(uw)}{h(u)} \leq C \cdot \ln^{-1} w$  и, следовательно,  $R_h(w) < 2^{-1}$  при  $w = \exp(2C) > 1$ . При  $t \rightarrow 0$  функция  $h$  имеет предел, конечный или равный  $+\infty$ . Если этот предел равен  $+\infty$ , то эквивалентность условий 2 и 4 вытекает из эквивалентности условий 2 и 4 леммы B, примененной к функции  $1/h$ , при этом следует заметить, что  $R_{1/h}(s) = R_h(s^{-1}) \forall s > 0$ . Если же  $\lim_{t \rightarrow 0} h(t) < +\infty$ , то условия 2 и 4 не выполняются. Лемма доказана.

**Лемма 1.** Пусть  $1 \leq r \leq \infty$ ,  $h(t)$  ( $0 \leq t \leq 1$ ) — функция из класса  $\Phi$ ,  $\int_{0+} h(t)t^{-1} dt < \infty$  при  $r < \infty$ ,  $\rho(x)$  ( $x \in \mathbb{R}$ ) — функция из класса  $C_0^\infty(B)$

такая, что  $\int \rho(x) dx = 1$  и  $(M, \rho)$ -регуляризация сохраняет решения уравнения  $P(D)u = 0$ . Тогда если  $f \in U_r(M, P(D), G, h)_{\text{loc}}$ , то функция  $f$  может быть так переопределена на некотором множестве лебеговой меры нуль в  $G$ , что переопределенная функция будет принадлежать классу  $S(M, \rho, G, \phi)_{\text{loc}}$ , где  $\phi(s) := h(s) + \int_0^s h(t)t^{-1} dt$  при  $1 \leq r < \infty$ ,  $\phi(s) := h(s)$  при  $r = \infty$  ( $0 \leq s \leq 1$ ).

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Случай  $r = \infty$  тривиален, поэтому считаем, что  $r < \infty$ . Выберем области  $G_1$  и  $G_2$  так, что  $G_1 \Subset G_2 \Subset G$ , и возьмем  $d > 0$  таким, что  $G_1 + B_M(0, d) \subset G_2$ . Рассмотрим семейство функций

$$f_s(x) := \int f(x + s^M t) \rho(t) dt, \quad x \in G_1, \quad 0 < s < d.$$

Каждая функция этого семейства непрерывна в  $G_1$ , и при всех  $s \in (0, d)$  и  $x \in G_1$  выполнены равенства

$$\begin{aligned} f_s(x) - f_{s/2}(x) &= \int f(x + s^M t) \rho(t) dt - \int f(x + (2^{-1}s)^M t) \rho(t) dt \\ &= \int f(x + s^M t) (\rho(t) - 2^{|M|} \rho(2^M t)) dt = \int f(x + s^M t) \lambda(t) dt, \end{aligned}$$

где  $\lambda(t) := \rho(t) - 2^{|M|}\rho(2^M t)$  ( $t \in \mathbb{R}^n$ ). Поскольку  $\int u(x + s^M t)\lambda(t) dt = 0$  для любой функции  $u$ , удовлетворяющей равенству  $P(D)u = 0$  в некоторой (зависящей от  $u$ ) окрестности  $M$ -шара  $B_M(x, s)$ , то, используя неравенство Гёльдера, получим

$$\begin{aligned} |f_s(x) - f_{s/2}(x)| &\leq \inf_u \left( \int_B |f(x + s^M t) - u(x + s^M t)|^r dt \right)^{1/r} \cdot \|\lambda\|_{L_{r/(r-1)}(B)} \\ &\leq s^{-|M|} E_r(M, P(D), f, x, s) \cdot \|\lambda\|_{L_{r/(r-1)}(B)} \leq Ch(s), \end{aligned}$$

где  $\inf$  берется по всем функциям  $u$  указанного выше вида,  $C = C(f, G_2, \rho, r)$ .

Пусть  $s$  принимает значения  $2^{-p}$  и  $f_{(p)}(x) := f_{2^{-p}}(x)$ ,  $p \in \mathbb{N}$ ,  $p > -\log_2 d$ ,  $x \in G_1$ . Если  $p, q \in \mathbb{N}$  таковы, что  $q > p > -\log_2 d$ , то

$$\begin{aligned} |f_{(p)}(x) - f_{(q)}(x)| &= \sum_{i=1}^{q-p} |f_{(p+i-1)}(x) - f_{(p+i)}(x)| \leq C \sum_{i=1}^{q-p} h(2^{1-p-i}) \\ &\leq Ch(2^{-p}) + C \sum_{i=2}^{q-p} h(2^{1-p-i}) \leq C \left( h(2^{-p}) + \sum_{i=2}^{q-p} \int_{2^{1-p-i}}^{2^{2-p-i}} h(t)t^{-1} dt \right) \\ &\leq C \left( h(2^{-p}) + \int_0^{2^{-p}} h(t)t^{-1} dt \right) = C\phi(2^{-p}), \end{aligned}$$

откуда следует, что при  $p \rightarrow \infty$  последовательность функций  $f_{(p)}$  равномерно сходится в области  $G_1$  к некоторой функции  $g \in C(G_1)$ . Переходя в последней цепочке неравенств к пределу при  $q \rightarrow \infty$ , получаем, что  $|f_{(p)} - g(x)| \leq C\phi(2^{-p})$  при всех  $x \in G_1$ ,  $p > -\log_2 d$ . Аналогично, фиксируя произвольное  $s \in (0, d)$ , выводим, что при  $p \rightarrow \infty$  последовательность функций  $f_{s2^{-p}}$  равномерно сходится в области  $G_1$  к некоторой функции  $g_s \in C(G_1)$ , причем

$$|f_{s2^{-p}}(x) - g_s(x)| \leq C\phi(s2^{-p}) \quad (x \in G_1, p \in \mathbb{N}).$$

Поскольку  $\|f_s - f\|_{L_1(G_1)} \rightarrow 0$  при  $s \rightarrow 0$ , то все функции  $g_s$  совпадают в области  $G_1$  с функцией  $g$ , которая, в свою очередь, очевидно, совпадает почти всюду в  $G_1$  с функцией  $f$ , и

$$\begin{aligned} \left| g(x) - \int g(x + s^M t)\rho(t) dt \right| &= \left| g_s(x) - \int f(x + s^M t)\rho(t) dt \right| \\ &= |g_s(x) - f_s(x)| \leq C\phi(s) \end{aligned}$$

при всех  $x \in G_1$ ,  $s \in (0, d)$ . Лемма доказана.

Ниже приводится пример, показывающий существенность требования сходимости интеграла  $\int_{0+} h(t)t^{-1} dt$  в лемме 1 и ее неулучшаемость в определенном смысле. Но вначале докажем одну простую лемму, обосновывающую наши последующие рассуждения с  $M$ -шарами, которую мы будем неоднократно использовать без специальных ссылок.

**Лемма 2.** Для любых  $r, s \in \mathbb{R}$ ,  $r \geq s > 0$ , и  $k \in \mathbb{N}$  справедливы следующие включения:

$$1) \partial B_M(0, r) + B_M(0, s) \subset B_M(0, r + s) \setminus B_M(r - s)^0;$$

- 2)  $B_M(0, r) + B_M(0, s) \subset B_M(0, r + s)$ ;  
 3)  $kB_M(0, r) \subset B_M(0, kr)$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение 3 вытекает по индукции из утверждения 2, которое, в свою очередь, следует из утверждения 1. Докажем последнее, для чего воспользуемся следующим свойством единичного шара  $B$ : если  $x, y \in B$  и  $0 \leq \alpha \leq 1$ , то  $\alpha^M \cdot x + (1 - \alpha)^M \cdot y \in B$ , причем если хотя бы одна из точек  $x, y$  лежит в  $B^0$ , то  $\alpha^M \cdot x + (1 - \alpha)^M \cdot y \in B^0$ . В самом деле, используя неравенство Коши – Буняковского, получаем, что если  $\sum_{j=1}^n x_j^2 \leq 1$  и  $\sum_{j=1}^n y_j^2 \leq 1$ , то

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^n (\alpha^{M_j} x_j + (1 - \alpha)^{M_j} y_j)^2 \\ &= \sum_{j=1}^n (\alpha^{M_j} x_j)^2 + 2 \sum_{j=1}^n (\alpha(1 - \alpha))^{M_j} x_j y_j + \sum_{j=1}^n ((1 - \alpha)^{M_j} y_j)^2 \\ &\leq \sum_{j=1}^n (\alpha x_j)^2 + 2\alpha(1 - \alpha) \left( \sum_{j=1}^n x_j \right) \left( \sum_{j=1}^n y_j \right) + \sum_{j=1}^n ((1 - \alpha) y_j)^2 \\ &\leq \alpha^2 + \alpha(1 - \alpha)^2 + (1 - \alpha)^2 = 1, \end{aligned}$$

причем последнее неравенство строгое при  $\left( \sum_{j=1}^n x_j^2 \right) \left( \sum_{j=1}^n y_j^2 \right) < 1$  и  $\alpha \in (0, 1)$ .

Пусть  $x \in \partial B_M(0, r)$  и  $y \in B_M(x, s)$ , что означает

$$\sum_{j=1}^n x_j^2 r^{-2M_j} = 1 \quad \text{и} \quad \sum_{j=1}^n (x_j - y_j)^2 s^{-2M_j} \leq 1.$$

Пользуясь отмеченным выше свойством единичного шара, получаем

$$(r + s)^{-M} \cdot y = \left( \frac{r}{r + s} \right)^M \cdot (r^{-M} \cdot x) + \left( \frac{s}{r + s} \right)^M \cdot (s^{-M} \cdot (y - x)) \in B,$$

следовательно,  $y \in B_M(0, r + s)$ . Допуская  $y \in B_M(0, r - s)^0$ , мы бы имели

$$r^{-M} \cdot x = \left( \frac{r - s}{r} \right)^M \cdot ((r - s)^{-M} \cdot x) + \left( \frac{s}{r} \right)^M \cdot (s^{-M} \cdot (x - y)) \in B^0,$$

что невозможно. Лемма доказана.

Следующий пример для случая  $M = (1, \dots, 1)$  содержится в [17].

ПРИМЕР. Пусть  $h(t)$  ( $0 \leq t \leq 1$ ) – функция из класса  $\Phi$  такая, что  $h(t)t^{-1}$  почти убывает на  $[0, 1]$ . Положим  $h_1(t) := h(3^{-1}t)$ ,  $0 \leq t \leq 1$ , и рассмотрим функцию

$$f(x) := \int_{r_M(x)}^1 t^{-1} h_1(t) dt, \quad x \in B \setminus \{0\},$$

где  $r_M(x)$  определено из равенства  $\sum_{j=1}^n x_j^2 (r_M(x))^{-2M_j} = 1$ . Возьмем произвольный  $M$ -шар  $B_M(x, s) \subset G$  с  $s \in (0, 3^{-1})$ . Возможны случаи  $r_M(x) \leq 2s$  и

$r_M(x) > 2s$ . Предположим, что имеет место первый из них. Тогда по предыдущей лемме  $B_M(x, s) \subset B_M(0, 3s)$ . Обозначим через  $Q_j$  множество  $B_M(0, 3s2^{-j}) \setminus B_M(0, 3s2^{-j-1})$ ,  $j \in \mathbb{N}_0$ , и зафиксируем  $p \in [1, +\infty)$ . Если  $a > 0$ , то полагаем  $K(a) := \sup_{t \geq 1} t^{-a} \ln t$ . Взяв  $a > 0$  таким, что  $ap < |M|$ , получим следующую цепочку неравенств:

$$\begin{aligned} E_{p,0}(M, f, x, s) &\leq \left( s^{-|M|} \int_{B_M(0,3s)} \left| f(y) - \int_{3s}^1 t^{-1} h_1(t) dt \right|^p dy \right)^{1/p} \\ &\leq \left( s^{-|M|} \int_{B_M(0,3s)} \left| \int_{r_M(y)}^1 t^{-1} h_1(t) dt - \int_{3s}^1 t^{-1} h_1(t) dt \right|^p dy \right)^{1/p} \\ &\leq \left( s^{-|M|} \int_{B_M(0,3s)} \left| \int_{r_M(y)}^{3s} t^{-1} h_1(t) dt \right|^p dy \right)^{1/p} \\ &\leq h_1(3s) \left( s^{-|M|} \int_{B_M(0,3s)} \left| \int_{r_M(y)}^{3s} t^{-1} dt \right|^p dy \right)^{1/p} \\ &\leq h(s) \left( s^{-|M|} \int_{B_M(0,3s)} |\ln((3s)^{-1} r_M(y))|^p dy \right)^{1/p} \\ &\leq K(a) h(s) \left( s^{-|M|} \int_{B_M(0,3s)} |(3s)^{-1} r_M(y)|^{-ap} dy \right)^{1/p} \\ &\leq K(a) h(s) s^{a-|M|/p} 3^a \left( \sum_{j=0}^{\infty} \int_{Q_j} |r_M(y)|^{-ap} dy \right)^{1/p} \leq K(a) h(s) s^{a-|M|/p} \\ &\quad \times 3^a \left( \sum_{j=0}^{\infty} (3s2^{-j-1})^{-ap} (3s2^{-j})^{|M|} \right)^{1/p} \left( \int_B dt \right)^{1/p} = C(M, p, a) h(s). \end{aligned}$$

Предположим теперь, что  $r_M(x) > 2s$ . Из леммы 2 вытекает, что  $B_M(x, s) \subset B_M(0, r_M(x) + s) \setminus B_M(0, r_M(x) - s)^0$ , откуда, пользуясь почти убыванием функции  $t^{-1}h(t)$ , получаем

$$\begin{aligned} E_{\infty,0}(M, f, x, s) &\leq \sup_{y \in B_M(x,s)} \left| f(y) - \int_{r_M(x)}^1 t^{-1} h_1(t) dt \right| \\ &\leq \sup_{y \in B_M(x,s)} \left| \int_{r_M(y)}^1 t^{-1} h_1(t) dt - \int_{r_M(x)}^1 t^{-1} h_1(t) dt \right| = \sup_{y \in B_M(x,s)} \left| \int_{r_M(y)}^{r_M(x)} t^{-1} h_1(t) dt \right| \\ &\leq C(h) s^{-1} h_1(s) \int_{r_M(x)-s}^{r_M(x)+s} dt \leq 2C(h) h_1(s) \leq 2C(h) h(s). \end{aligned}$$

Таким образом,  $f \in C_p(M, 0, B^0, h) \subset U_p(M, P(D), B^0, h)$ . Если функция  $h$  такова, что  $\int_{0+} h(t)t^{-1} dt = \infty$ , то  $f \notin L_\infty(B^0)_{\text{loc}}$ , и тем самым  $f \notin S(M, \rho, B^0, h)_{\text{loc}}$  при любой функции  $\rho \in C_0^\infty(B)$ . Если же  $\int_{0+} h(t)t^{-1} dt < \infty$ , то, полагая

$f(0) = \int_0^1 h_1(t)t^{-1} dt$  и используя почти убывание функции  $t^{-1}h(t)$ , получаем

$$f(0) - f(y) = \int_0^{r_M(y)} h_1(t)t^{-1} dt \geq C(h) \int_0^{r_M(y)} h(t)t^{-1} dt \quad (C(h) > 0),$$

$$E_{\infty,0}(M, f, 0, r_M(y)) \geq 2^{-1}(f(0) - f(y)) \geq 2^{-1}C(h) \int_0^{r_M(y)} h(t)t^{-1} dt.$$

Если помимо условия  $\int_{0+} h(t)t^{-1} dt < \infty$  функция  $h$  такова, что  $R_h(s) = o(s)$  и  $\int_0^s h(t)t^{-1} dt \neq O(h(s))$  при  $s \rightarrow 0$ , то из леммы В и приводимых ниже теоремы 1 и замечания 1 вытекает, что  $f \notin S(M, \rho, B^0, h)$  при любой функции  $\rho \in C_0^\infty(B)$ .

Отметим, что в случае расходимости интеграла  $\int_{0+} h(t)t^{-1} dt$  для построения подобного примера на функцию  $h$  необходимо накладывать дополнительные условия, как, например, условие почти убывания функции  $t^{-1}h(t)$ . В самом деле, если функция  $h \in \Phi$  такова, что  $\lim_{t \rightarrow 0} t^{-m}h(t) = 0$ , то вне зависимости от сходимости или расходимости интеграла  $\int_{0+} h(t)t^{-1} dt$  класс  $U_p(M, P(D), G, h)_{\text{loc}}$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ , совпадает с множеством всех решений уравнения  $P(D)u = 0$  в  $G$  (см. [3, 4]).

Следующая лемма является основной в работе. В случае степенной функции  $H$  подобные ей утверждения хорошо известны и часто применяются для доказательства гёльдеровости решений систем дифференциальных уравнений в частных производных (см. [14, с. 86–87; 18, с. 297–299]). С нашей точки зрения, формулировка подобных результатов в терминах функции растяжения придает им существенно более гибкую форму.

**Лемма 3.** Пусть  $l > -1$ ,  $d, C_1 > 0$ ,  $H(t)$  и  $F(t)$  — функции, непрерывные и неубывающие на  $(0, d]$ , такие, что  $\lim_{t \rightarrow 0} H(t) = 0$ ,  $R_{H,d}(s) = o(s^{l+1})$  при  $s \rightarrow \infty$  и при всех  $K > 2$  и  $s \in (0, K^{-1}d)$  справедливо неравенство

$$F(s) \leq C_1(H(Ks) + K^{-l-1}F(Ks)). \quad (6)$$

Тогда существуют такие  $C_2 > 0$  и  $v \in (0, d)$ , не зависящие от функции  $F$ , что при всех  $s \in (0, v)$  выполняется неравенство  $F(s) \leq C_2(1 + F(d))H(s)$ .

**Доказательство.** Пусть  $K > 2$ ,  $s > 0$ , и пусть  $j \in \mathbb{N}$  таково, что  $K^j s \leq d$ . Тогда, применяя неравенство (6)  $j$  раз, получим

$$\begin{aligned} F(s) &\leq C_1(H(Ks) + K^{-l-1}F(Ks)) \\ &\leq C_1H(Ks) + C_1^2K^{-l-1}(H(K^2s) + K^{-l-1}F(K^2s)) \\ &= C_1H(Ks) + C_1^2K^{-l-1}H(K^2s) + C_1^2(K^{-l-1})^2F(K^2s) \end{aligned}$$

$$\leq K^{l+1} \sum_{p=1}^j (C_1 K^{-l-1})^p H(K^p s) + (C_1 K^{-l-1})^j F(K^j s). \quad (7)$$

Пользуясь тем, что  $R_{H,d}(s) = o(s^{l+1})$  при  $s \rightarrow \infty$ , зафиксируем  $K > 2$  так, чтобы  $C_1 H(Ks)(K^{l+1} H(s))^{-1} < 2^{-1}$  при всех  $s \in (0, K^{-1}d)$  (из неубывания функции  $H$  следует, что в этом случае выполняется неравенство  $C_1 K^{-l-1} < 2^{-1}$ ). Тогда

$$(C_1 K^{-l-1})^p H(K^p s) \leq H(s) \prod_{q=1}^p C_1 K^{-l-1} \frac{H(K^q s)}{H(K^{q-1} s)} \leq 2^{-p} H(s) \quad (8)$$

при всех  $p \in \mathbb{N}$  и  $s \in (0, K^{-p}d)$ . Мы хотим выбрать  $v \in (0, d)$  таким, чтобы для каждого  $s \in (0, v)$  нашлось  $j \in \mathbb{N}$ , при котором одновременно выполнены неравенства  $(C_1 K^{-l-1})^j \leq H(s)$  и  $K^j s \leq d$ . Тогда из (7) и (8)

$$F(s) \leq K^{l+1} H(s) \sum_{p=1}^j 2^{-p} + H(s) F(K^j s) \leq K^{l+1} (1 + F(d)) H(s),$$

что и требуется доказать. Для доказательства возможности такого выбора  $v$  достаточно установить существование  $p_0 \in \mathbb{N}$ , при котором для всех натуральных  $p \geq p_0$  выполняется неравенство  $(C_1 K^{-l-1})^p < H(K^{-p-1}d)$ . В самом деле, если последнее имеет место, то из неубывания функции  $H$  следует, что объединение по  $p \geq p_0$  интервалов  $((C_1 K^{-l-1})^p, H(K^p d))$  есть интервал  $(0, H(K^{p_0}d))$ . Тогда, полагая  $v = K^{p_0}d$ , будем иметь следующее: если  $s \in (0, v)$ , то  $H(s) \in ((C_1 K^{-l-1})^p, H(K^{-p}d))$  для какого-то  $p \geq p_0$ , следовательно,  $(C_1 K^{-l-1})^p < H(s)$  и  $K^p s \leq d$ , что и нужно. Установим существование такого  $p_0$ . Для этого положим в (8)  $s = K^{-p-1}d$ ,  $p \in \mathbb{N}$ . Имеем  $(C_1 K^{-l-1})^p H(K^{-1}d) \leq 2^{-p} H(K^{-p-1}d)$  при всех  $p \in \mathbb{N}$ , откуда, фиксируя  $p_0$  так, что  $2^{p_0} H(K^{-1}d) > 1$ , получим, что

$$(C_1 K^{-l-1})^p \leq H(K^{-p-1}d) (2^p H(K^{-1}d))^{-1} < H(K^{-p-1}d)$$

при всех натуральных  $p \geq p_0$ . Лемма доказана.

### 3. Формулировки и доказательства основных результатов

**Теорема 1.** Пусть  $G$  — область в  $\mathbb{R}^n$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ ,  $l \in \mathbb{N}_0$ ,  $h$  — функция из класса  $\Phi_p$  такая, что  $R_h(s) = o(s^{l+1})$  при  $s \rightarrow \infty$ . Тогда  $U_p(M, P(D), G, h)_{\text{loc}} \subset C_p(M, l, G, h)_{\text{loc}}$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $\rho$  — функция из  $C_0^\infty(B)$  такая, что  $(M, \rho)$ -регуляризация сохраняет решения уравнения  $P(D)u = 0$ ,  $f \in U_p(M, P(D), G, h)_{\text{loc}}$ . Выберем области  $G_1$  и  $G_2$  так, что  $G_2 \Subset G_1 \Subset G$ , и пусть  $d_1, d_2 > 0$  таковы, что  $B_M(x, d_2) \subset G_1 \forall x \in G_2$ ,  $B_M(x, d_1) \subset G \forall x \in G_1$ .

Пусть  $z \in G_2$ ,  $s > 0$ ,  $B_M(z, s) \subset G_2$ ,  $t \in (0, d_2)$ . Определим функцию  $f_t(x)$ ,  $x \in G_2$ , равенством

$$f_t(x) := \int f(x + t^M \cdot \zeta) \rho(\zeta) d\zeta = f * \rho_t(\zeta)(x),$$

где  $\rho_t(\zeta) := t^{-|M|} \rho(-t^{-M} \cdot \zeta)$ ,  $\zeta \in \mathbb{R}^n$ . В дальнейшем будем считать, что  $p < \infty$ ; при  $p = \infty$  все проводимые ниже рассуждения остаются в силе с естественными

изменениями. Поскольку  $f \in U_p(M, P(D), G_1, h)$ , то, используя обобщенное неравенство Минковского, имеем следующую цепочку соотношений, в которых инфимум берется по множеству всех функций  $u$ , удовлетворяющих равенству  $P(D)u = 0$  в некоторой (зависящей от  $u$ ) окрестности  $M$ -шара  $B_M(z, s + t)$ :

$$\begin{aligned}
\|f_t - f\|_{L_p(B_M(z, s))} &= \left( \int_{B_M(z, s)} |f_t(y) - f(y)|^p dy \right)^{1/p} \\
&= \left( \int_{B_M(z, s)} \left| \int |f(y + t^M \cdot \zeta) \rho(\zeta) d\zeta - \int f(y) \rho(\zeta) d\zeta|^p dy \right)^{1/p} \\
&= \inf_u \left( \int_{B_M(z, s)} \left| \int f(y + t^M \cdot \zeta) \rho(\zeta) d\zeta \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - \int f(y) \rho(\zeta) d\zeta - \int u(y + t^M \cdot \zeta) \rho(\zeta) d\zeta - \int u(y) \rho(\zeta) d\zeta \right|^p dy \right)^{1/p} \\
&\leq \inf_u \left( \left( \int_{B_M(z, s)} \left| \int (f(y + t^M \cdot \zeta) - u(y + t^M \cdot \zeta)) \rho(\zeta) d\zeta \right|^p dy \right)^{1/p} \right. \\
&\quad \left. + \left( \int_{B_M(z, s)} \left| \int (f(y) - u(y)) \rho(\zeta) d\zeta \right|^p dy \right)^{1/p} \right) \\
&\leq \inf_u \left( \int |\rho(\zeta)| \left( \left( \int_{B_M(z, s)} |f(y + t^M \cdot \zeta) - u(y + t^M \cdot \zeta)|^p dy \right)^{1/p} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + \left( \int_{B_M(z, s)} |f(y) - u(y)|^p dy \right)^{1/p} \right) d\zeta \right) \\
&\leq 2 \left( \int |\rho(\zeta)| d\zeta \right) \inf_u \left( \int_{B_M(z, s+t)} |f(y) - u(y)|^p dy \right)^{1/p} \\
&= 2 \left( \int |\rho(\zeta)| d\zeta \right) E_p(M, P(D), f, z, s + t). \quad (9)
\end{aligned}$$

Пусть  $b$  — наименьшее число, при котором для каждого мультииндекса  $k = (k_1, \dots, k_n)$  из  $|k| > b$  вытекает  $|k \cdot M| > l$ . Обозначим  $\partial^k = \frac{\partial^{|k|}}{\partial y_1^{k_1} \dots \partial y_n^{k_n}}$  и рассмотрим  $\partial^k f_t(z + w(x - z))$ , где  $x \in B_M(z, s)$ ,  $w \in [0, 1]$ ,  $|kM| > l$ . Для каждого полинома  $R$  с  $\deg_M R \leq l$  имеем

$$\begin{aligned}
\partial^k f_t(z + w(x - z)) &= t^{-|M| - |k \cdot M|} (-1)^{|k|} \\
&\quad \times \int_{B_M(z + w(x - z), t)} (f(y) - R(y)) \partial^k \rho(t^{-M} \cdot (y - z - w(x - z))) dy,
\end{aligned}$$

откуда, полагая  $q = \frac{p}{p-1}$  и пользуясь неравенством Гёльдера, получаем следующую цепочку неравенств, в которой инфимум берется по множеству всех полиномов  $R$  с  $\deg_M R \leq l$ :

$$|\partial^k f_t(z + w(x - z))| \leq t^{-|M| - |k \cdot M|}$$

$$\begin{aligned}
 & \times \inf_R \int_{B_M(z+w(x-z),t)} |(f(y) - R(y))\partial^k \rho(t^{-M} \cdot (y - z - w(x - z)))| dy \\
 & \leq t^{-|M|-|k \cdot M|} \inf_R \left( \int_{B_M(z+w(x-z),t)} |f(y) - R(y)|^p dy \right)^{1/p} \\
 & \times \left( \int_{B_M(z+w(x-z),t)} |\partial^k \rho(t^{-M} \cdot (y - z - w(x - z)))|^q dy \right)^{1/q} \\
 & \leq t^{-|M|/p-|k \cdot M|} \inf_R \left( \int_{B_M(z+w(x-z),t)} |f(y) - R(y)|^p dy \right)^{1/p} \\
 & \times \left( t^{-|M|} \int_{B_M(z+w(x-z),t)} |\partial^k \rho(t^{-M} \cdot (y - z - w(x - z)))|^q dy \right)^{1/q} \\
 & \leq t^{-|M|/p-|k \cdot M|} \|\partial^k \rho\|_{L_q(B)} \inf_R \left( \int_{B_M(z+w(x-z),t)} |f(y) - R(y)|^p dy \right)^{1/p} \\
 & \leq t^{-|M|/p-|k \cdot M|} \|\partial^k \rho\|_{L_q(B)} \|E_{p,l}(M, f, z, s + t). \quad (10)
 \end{aligned}$$

Рассмотрим разложение Тейлора  $\sum_{|k|=0}^b (y-z)^k \partial^k f_t(z) (k!)^{-1}$  функции  $f_t$  с центром в точке  $z$  порядка  $b$  и представим его в виде

$$\begin{aligned}
 \sum_{|k|=0}^b (y-z)^k \frac{\partial^k f_t(z)}{k!} &= \sum_{0 \leq |k| \leq b, |k \cdot M| \leq l} (y-z)^k \frac{\partial^k f_t(z)}{k!} \\
 &+ \sum_{0 \leq |k| \leq b, |k \cdot M| > l} (y-z)^k \frac{\partial^k f_t(z)}{k!}.
 \end{aligned}$$

Из (9), (10) и формулы Тейлора с остаточным членом в интегральной форме получаем цепочку неравенств:

$$\begin{aligned}
 E_{p,l}(M, f, z, s) &\leq \left( \int_{B_M(z,s)} \left| f(y) - \sum_{0 \leq |k| \leq b, |k \cdot M| \leq l} (y-z)^k \frac{\partial^k f_t(z)}{k!} \right|^p dy \right)^{1/p} \\
 &\leq \left( \int_{B_M(z,s)} |f(y) - f_t(y)|^p dy \right)^{1/p} \\
 &+ \left( \int_{B_M(z,s)} \left| \sum_{0 \leq |k| \leq b, |k \cdot M| > l} (y-z)^k \frac{\partial^k f_t(z)}{k!} \right|^p dy \right)^{1/p} + (b+1) \\
 &\times \left( \int_{B_M(z,s)} \left| \sum_{|k|=b+1} \frac{(y-z)^k}{k!} \int_0^1 (1-w)^b \partial^k f_t(z + w(y-z)) dw \right|^p dy \right)^{1/p} \\
 &\leq 2 \left( \int |\rho(\zeta)| d\zeta \right) E_p(M, P(D), f, z, s + t)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + C(p)s^{|M|/p} \sup_{y \in B_M(z,s)} \left| \sum_{0 \leq |k| \leq b, |k \cdot M| > l} (y-z)^k \frac{\partial^k f_t(z)}{k!} \right| + C(p)(b+1)s^{|M|/p} \\
& \times \sup_{y \in B_M(z,s)} \left| \sum_{|k|=b+1} \frac{(y-z)^k}{k!} \int_0^1 (1-w)^b \partial^k f_t(z+w(y-z)) dw \right| \\
& \leq 2 \left( \int |\rho(\zeta)| d\zeta \right) E_p(M, P(D), f, z, s+t) + C(p)s^{|M|/p} \\
& \times \sum_{0 \leq |k| \leq b, |k \cdot M| > l} \frac{s^{|k \cdot M|}}{k!} t^{-|M|/p - |k \cdot M|} \|\partial^k \rho\|_{L_q(B)} \|E_{p,l}(M, f, z, s+t)\| \\
& + C(p)(b+1)s^{|M|/p} \sum_{|k|=b+1} \frac{s^{|k \cdot M|}}{k!} t^{-|M|/p - |k \cdot M|} \|\partial^k \rho\|_{L_q(B)} \|E_{p,l}(M, f, z, s+t)\| \\
& \leq C(p, l, M, \rho) E_p(M, P(D), f, z, s+t) \\
& + C(p, l, M, \rho) \sum_{0 \leq |k| \leq b+1, |k \cdot M| > l} \left(\frac{s}{t}\right)^{|k \cdot M| + M/p} E_{p,l}(M, f, z, s+t).
\end{aligned}$$

Пусть  $t = \frac{K}{2}s$ , где  $K > 2$ . Тогда  $t + s < Ks$ ,

$$\left(\frac{s}{t}\right)^{|k \cdot M| + M/p} = \left(\frac{K}{2}\right)^{-|k \cdot M| - M/p} \leq \left(\frac{K}{2}\right)^{-l-1-M/p} \quad \text{при } |K \cdot M| > l,$$

откуда

$$\begin{aligned}
E_{p,l}(M, f, z, s) & \leq C(p, l, M, \rho) E_p(M, P(D), f, z, s+t) \\
& + C(p, l, M, \rho) \sum_{0 \leq |k| \leq b+1, |k \cdot M| > l} \left(\frac{s}{t}\right)^{|k \cdot M| + M/p} E_{p,l}(M, f, z, s+t) \\
& \leq C(p, l, M, \rho, f, G_1) ((Ks)^{|M|/p} h(Ks) + K^{-l-1-M/p} E_{p,l}(M, f, z, Ks)).
\end{aligned}$$

Применяя лемму 3 (к функции  $H(s) := s^{|M|/p} h(s)$ ), заключаем, что

$$E_{p,l}(M, f, z, s) \leq C(p, l, M, \rho, f, G_1, G_2) s^{|M|/p} h(s)$$

и, следовательно,  $f \in C_p(M, l, G, h)_{\text{loc}}$ .

Теорема доказана.

**ЗАМЕЧАНИЕ 1.** При  $p = \infty$  в приведенных выше рассуждениях утверждение о принадлежности функции  $f$  классу  $C_\infty(M, l, G, h)_{\text{loc}}$  фактически выводится только из того, что  $f \in S(M, \rho, G, h)_{\text{loc}}$ .

Пусть  $h(t) \equiv t^\alpha$ ,  $0 < \alpha < \deg_M P$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ . Тогда из леммы 1 и теоремы 1 с учетом только что сделанного замечания вытекает цепочка включений

$$\begin{aligned}
C_\infty(M, [\alpha], G, h)_{\text{loc}} & \subset C_p(M, [\alpha], G, h)_{\text{loc}} \\
& \subset U_p(M, P(D), G, h)_{\text{loc}} \subset C_\infty(M, [\alpha], G, h)_{\text{loc}},
\end{aligned}$$

откуда получаем, что при всех  $p \in [1, \infty]$  выполнены равенства

$$C_1(M, [\alpha], G, h)_{\text{loc}} = U_p(M, P(D), G, h)_{\text{loc}} = C_\infty(M, [\alpha], G, h)_{\text{loc}}.$$

С другой стороны, из результатов работы [12] (см. также [13]) следует совпадение классов  $C_1(M, [\alpha], G, h)_{\text{loc}}$  ( $h(t) \equiv t^\alpha$ ,  $0 < \alpha < \deg_M P$ ) и  $\Lambda^{M, \alpha}(G)_{\text{loc}}$ . Резюмируя сказанное, получаем

**Следствие 1.1.** Пусть  $G$  — область в  $\mathbb{R}^n$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ ,  $0 < \alpha < \deg_M P$ ,  $h(t) \equiv t^\alpha$ . Тогда  $U_p(M, P(D), G, h)_{\text{loc}} = \Lambda^{M, \alpha}(G)_{\text{loc}}$ .

Выделим один важный частный случай теоремы 1. Напомним (см., например, [19]), что при  $M = (1, \dots, 1)$ ,  $1 \leq p < \infty$  и  $h(t) \equiv 1$  класс  $C_p(M, 0, G, h)$  не зависит от  $p$  и совпадает с классом  $BMO$  функций с ограниченным средним колебанием в области  $G$ .

**Следствие 1.2.** Пусть  $G$  — область в  $\mathbb{R}^n$ ,  $P(D)$  — однородный эллиптический оператор с постоянными коэффициентами,  $1 \leq p < \infty$ ,  $h(t) \equiv 1$ . Тогда  $U_p(P(D), G, h)_{\text{loc}} = BMO(G)_{\text{loc}}$ .

**Следствие 1.3.** Пусть  $G$  — область в  $\mathbb{R}^n$ ,  $P(D)$  — однородный эллиптический оператор с постоянными коэффициентами порядка  $m \geq 2$ ,  $\omega(t)$  ( $t \geq 0$ ) — функция типа модуля непрерывности. Тогда класс  $U_\infty(P(D), G, \omega)_{\text{loc}}$  совпадает с множеством всех функций  $f \in C(G)$ , для которых  $\omega_2(f, G_0; t) = O(\omega(t))$  при  $t \rightarrow 0$  в каждой подобласти  $G_0 \in G$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Поскольку для  $\omega$  как функции типа модуля непрерывности выполняется условие  $R_\omega(s) \leq 2s = o(s^2)$  при  $s \rightarrow \infty$  (см., например, [20, с. 20]), то непрерывность функции  $f$  и нужная нам оценка ее второго модуля непрерывности вытекают из теоремы 1, замечания 1 и того, что вторая разность равна нулю для линейной функции. Обратное, из непрерывности  $f$  и приведенной выше оценки ее второго модуля непрерывности следует, что  $f \in S(\rho, G, \omega)_{\text{loc}}$  для каждой функции  $\rho \in C_0^\infty(B)$ , которая зависит только от расстояния до начала координат, откуда, снова пользуясь теоремой 1 и замечанием 1, получаем, что  $f \in C_\infty(1, G, \omega)_{\text{loc}} \subset U_\infty(P(D), G, \omega)_{\text{loc}}$ .

**Теорема 2.** Пусть  $G$  — область в  $\mathbb{R}^n$ ,  $1 \leq p < \infty$ ,  $h$  — функция из класса  $\Phi_p$  такая, что  $R_h(s) = o(1)$  при  $s \rightarrow \infty$ . Тогда  $U_p(M, P(D), G, h)_{\text{loc}} = L_p(M, G, h)_{\text{loc}}$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Включение  $L_p(M, G, h)_{\text{loc}} \subset U_p(M, P(D), G, h)_{\text{loc}}$  очевидно, поэтому нужно установить только обратное к нему. Это делается по той же схеме, что и в теореме 1. Сохраняя обозначения, введенные при доказательстве этой теоремы, и используя (9), получаем оценки

$$\begin{aligned} \|f\|_{L_p(B_M(z, s))} &\leq \left( \int_{B_M(z, s)} |f_t(y) - f(y)|^p dy \right)^{1/p} + \|f_t\|_{L_p(B_M(z, s))} \\ &\leq 2 \left( \int |\rho(\zeta)| d\zeta \right) E_p(M, P(D), f, z, s + t) + C(p)s^{|M|/p} \|f_t\|_{L_\infty(B_M(z, s))}. \end{aligned} \quad (11)$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} |f_t(y)| &\leq t^{-|M|} \int_{B_M(y, t)} |f(w)\rho(-t^{-M} \cdot (w - y))| dw \leq t^{-|M|/p} \\ &\times \|f\|_{L_p(B_M(y, t))} \left( t^{-|M|} \int_{B_M(y, t)} |\rho(-t^{-M} \cdot (w - y))|^{p/(p-1)} dw \right)^{1-1/p} \\ &\leq \|f\|_{L_p(B_M(y, t))} \|t^{-|M|/p} \rho\|_{L_{p/(p-1)}(B)}. \end{aligned} \quad (12)$$

Полагая, как и в теореме 1,  $t = \frac{K}{2}s$ , из (11) и (12) получаем

$$\begin{aligned} \|f\|_{L_p(B_M(z, s))} &\leq 2 \left( \int |\rho(\zeta)| d\zeta \right) E_p(M, P(D), f, z, s+t) \\ &\quad + C(p) \left( \frac{s}{t} \right)^{|M|/p} \|\rho\|_{L_{p/(p-1)}(B)} \sup_{y \in B_M(z, s)} \|f\|_{L_p(B_M(y, t))} \\ &\leq 2 \left( \int |\rho(\zeta)| d\zeta \right) E_p(M, P(D), f, z, Ks) \\ &\quad + C(p) K^{-|M|/p} \|\rho\|_{L_{p/(p-1)}(B)} \cdot \|f\|_{L_p(B_M(z, Ks))} \\ &\leq C(p, M, \rho, f, G_1) ((Ks)^{|M|/p} h(Ks) + K^{-|M|/p} \|f\|_{L_p(B_M(z, Ks))}), \end{aligned}$$

откуда с помощью леммы 3 (примененной к  $F(s) = \|f\|_{L_p(B_M(z, s))}$ ),  $H(s) = s^{|M|/p} h(s)$ ,  $l+1 = |M|/p$ ) вытекает нужное нам неравенство

$$\|f\|_{L_p(B_M(z, s))} \leq C(p, M, \rho, f, G_1, G_2) s^{|M|/p} h(s).$$

Теорема 2 доказана.

В заключение приведем один результат, показывающий существенность условий в лемме 1 и теореме 1.

**Теорема 3.** Пусть  $P(D)$  — однородный эллиптический оператор с постоянными коэффициентами,  $G$  — область в  $\mathbb{R}^n$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ ,  $\omega(t)$  ( $t \geq 0$ ) — функция типа модуля непрерывности. Тогда для совпадения классов  $U_p(P(D), G, \omega)_{\text{loc}}$  и  $\Lambda_\omega(G)_{\text{loc}}$  необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие:

$$\begin{aligned} \int_0^t \omega(u) u^{-1} du + t \int_t^1 \omega(u) u^{-2} du &= O(\omega(t)) \quad \text{при } p < \infty, \\ t \int_t^1 \omega(u) u^{-2} du &= O(\omega(t)) \quad \text{при } p = \infty \quad (t \rightarrow 0). \end{aligned}$$

**Доказательство.** Достаточность вытекает из леммы 1 и теоремы 1 с учетом лемм В и С. Докажем необходимость. Увеличивая функцию  $\omega$  на положительной полуоси не более чем в четыре раза с сохранением ее неубывания (см., например, [20, теорема 2.1, лемма 2.4]), можно без уменьшения общности считать, что функция  $t^{-1}\omega(t)$  невозрастающая,  $\omega(t)$  непрерывно дифференцируема ( $t > 0$ ) и существует такое положительное  $C = C(\omega)$ , что для всех  $t > 0$  выполняется неравенство

$$|\omega'(t)| \leq Ct^{-1}\omega(t). \quad (13)$$

Очевидно, можно также предполагать, что  $K_1 := \{x = (x_1, \dots, x_n) : x_2 = \dots = x_n = 0, 0 \leq x_1 \leq 1\} \subset G$ .

Невозможность нарушения условия  $\int_0^t \omega(u) u^{-1} du = O(\omega(t))$  в случае  $p < \infty$  иллюстрируется примером 1, поэтому, считая его выполненным, предположим, что нарушается условие  $t \int_t^1 \omega(u) u^{-2} du = O(\omega(t))$  ( $t \rightarrow 0$ ).

Пусть  $m \geq 2$ . Тогда (см. лемму 1, теорему 1, замечание 1, следствие 1.3) класс  $U_p(P(D), G, \omega)_{\text{loc}}$  совпадает с множеством всех функций  $f \in C(G)$ , для

которых  $\omega_2(f, G_0; t) = O(\omega(t))$  при  $t \rightarrow 0$  в каждой подобласти  $G_0 \in G$  (отметим для дальнейшего, что множество всех таких функций образует алгебру, см., например, [20, с. 62]). Существуют непрерывная функция  $g$ , определенная на отрезке  $[0, 1]$ , и положительные величины  $C_1(g)$  и  $C_2(g)$  такие, что для всех  $t \in (0, 1)$  выполняются неравенства

$$\omega(g, [0, 1]; t) \geq C_1(g)t \int_t^1 \omega(u)u^{-2} du,$$

$$\omega_2(g, [0, 1]; t) := \omega_2(g, (0, 1); t) \leq C_2(g)\omega(t)$$

(см. [20, теорема 5.1; 21]). По теореме О. В. Бесова [22] (см. также [20, теорема 8.2]) функцию  $g$  можно продолжить на отрезок  $[-1, 2]$  с выполнением последней оценки при всех  $t \in (0, 1)$  (возможно, увеличивая при этом значение величины  $C_2(g)$ ). Сохраняя для продолженной функции обозначение  $f$ , умножим ее на неотрицательную функцию  $h \in C_0^\infty([-1, 2])$  такую, что  $h(t) = 1 \forall t \in [0, 1]$ . Из сказанного выше следует, что функция  $f(x) = f(x_1, \dots, x_n) := g(x_1)h(x_1)$  принадлежит классу  $U_p(P(D), G, \omega)_{\text{loc}}$ , но в то же время

$$\omega(f, K_1; t) \geq C_1(g)t \int_t^1 \omega(u)u^{-2} du \quad \forall t \in (0, 1).$$

Таким образом, осталось рассмотреть случай  $m = 1$  (это, как известно, возможно только при  $n = 2$ ). Зафиксируем линейную функцию  $l(x) = l(x_1, x_2) = l_1x_1 + l_2x_2$  так, что  $P(D)l \equiv 0$  и  $\sup_{\|x\|=1} l(x) = 1$ , и определим в  $\mathbb{R}^2$  функцию  $f$  равенствами

$$f(x) = l(x) \int_{\|x\|}^1 t^{-2}\omega(t) dt \quad \text{при } x \neq 0, \quad f(0) = 0.$$

Отметим, что эта функция непрерывна в точке  $x = 0$  (см. [20, лемма 2.3]). Пусть

$$g(x) := \int_{\|x\|}^1 t^{-2}\omega(t) dt, \quad x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}.$$

Тогда  $g$  дважды непрерывно дифференцируема в  $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$  и из (13) вытекает существование такого  $C(g) > 0$ , что для каждого мультииндекса  $k = (k_1, k_2)$  с  $|k| = 1, 2$  и для всех  $x \in B \setminus \{0\}$  выполняется неравенство

$$|\partial^k g(x)| \leq C(g)h(\|x\|)\|x\|^{-1-|k|}. \quad (14)$$

Пусть  $r \in (0, 1/3)$ . Рассмотрим произвольный шар  $B(z, r) \subset B$ . Возможны случаи  $|z| \leq 2r$  и  $|z| > 2r$ . В первом из них  $B(z, r) \subset B$  и

$$\begin{aligned} E_\infty(P(D), f, z, r) &\leq E_\infty(P(D), f, 0, 3r) \\ &\leq \sup_{0 < \|x\| \leq 3r} \left| l(x) \int_{\|x\|}^1 t^{-2}\omega(t) dt - l(x) \int_{3r}^1 t^{-2}\omega(t) dt \right| \leq \sup_{0 < u < 3r} u \int_u^{3r} t^{-2}\omega(t) dt. \end{aligned} \quad (15)$$

Простая выкладка с приравнением нулю производной показывает, что функция  $f_r(u) := u \int_{3r}^u t^{-2} \omega(t) dt$  достигает максимума на интервале  $(0, 3r)$  в тех точках  $u$ , где  $f_r(u) = \omega(u)$ , поэтому из (15) получаем  $E_\infty(P(D), f, z, r) \leq \omega(3r) \leq 12\omega(r)$ .

Пусть теперь  $|z| > 2r$ . По формуле Тейлора для всех  $x \in B(z, r)$  имеем

$$\begin{aligned} f(x) &= f(z) + \sum_{|k|=1} (l(z)\partial^k g(z) + \partial^k l(z)g(z))(x-z)^k \\ &+ 2 \sum_{|k|=2} (x-z)^k (k!)^{-1} \int_0^1 (1-t)\partial^k f(z+t(x-z)) dt \\ &= f(z) + l(x-z)g(z) + \sum_{|k|=1} l(z)\partial^k g(z)(x-z)^k \\ &+ 2 \sum_{|k|=2} (x-z)^k (k!)^{-1} \int_0^1 (1-t)\partial^k f(z+t(x-z)) dt. \quad (16) \end{aligned}$$

Пользуясь (14) и невозрастанием функции  $t^{-1}\omega(t)$ , легко получить оценку

$$\begin{aligned} &\sum_{|k|=1} |l(z)\partial^k g(z)(x-z)^k| \\ &+ 2 \sum_{|k|=2} \left| (x-z)^k (k!)^{-1} \int_0^1 (1-t)\partial^k f(z+t(x-z)) dt \right| \leq C\omega(r), \end{aligned}$$

справедливую при всех  $x \in B(z, r)$ , где положительная величина  $C$  не зависит от  $z$  и  $r$ . Применяя (16), отсюда получаем

$$E_\infty(P(D), f, z, r) \leq \sup_{x \in B(z, r)} |f(x) - l(x-z)g(z)| \leq C\omega(r).$$

Поскольку  $f$  непрерывно дифференцируема в  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ , то  $f \in U_p(P(D), \mathbb{R}^n, \omega)_{\text{loc}}$ . С другой стороны,

$$|f(x) - f(0)| = \|x\| \int_{\|x\|}^1 t^{-2} \omega(t) dt \neq O(\omega(\|x\|)) \quad (x \rightarrow 0).$$

Теорема доказана.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Федоров В. С. Sur la representation des fonctions analytiques au voisinage d'un ensemble de ses points singulier // *Мат. сб.* 1928. Т. 35. С. 237–250.
2. Kaufman R., Wu J.-M. Removable singularities for analytic or subharmonic functions // *Ark. Mat.* 1980. V. 18, N 4. P. 107–116.
3. Ищанов Б. Ж. Незамкнутые особые множества для слабых решений линейных дифференциальных уравнений // *Геометрические вопросы теории функций и множеств*. Калинин: Калининск. гос. ун-т, 1989. С. 41–49.
4. Ищанов Б. Ж. О представлении решений некоторых классов уравнений в виде потенциалов мер, распределенных на множестве особенностей // *Докл. РАН.* 1998. Т. 358, № 4. С. 455–458.

5. Долженко Е. П. Работы Д. Е. Меньшова по теории аналитических функций и современное состояние теории моногенности // Успехи мат. наук. 1992. Т. 47, № 5. С. 67–96.
6. Покровский А. В. Локальные аппроксимации решениями гипоеллиптических уравнений и устранимые особенности // Докл. РАН. 1999. Т. 367, № 1. С. 15–17.
7. Хермандер Л. Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными. М.: Мир, 1986. Т. 2.
8. Волевич Л. Р. Локальные свойства решений квазиэллиптических систем // Мат. сб. 1962. Т. 59. С. 3–52.
9. Покровский А. В. Теоремы о среднем для решений линейных дифференциальных уравнений с частными производными // Мат. заметки. 1998. Т. 64, № 2. С. 260–272.
10. Peetre J. On the theory of  $\mathcal{L}_{p,\lambda}$  spaces // J. Funct. Anal. 1968. V. 4. P. 71–87.
11. Бесов О. В., Ильин В. П., Никольский С. М. Интегральные представления функций и теоремы вложения. М.: Наука, 1996.
12. Аджиев С. С. Характеризация функциональных пространств  $B_{p,q}^s(G)$ ,  $L_{p,q}^s(G)$ ,  $W_p^s(G)$  и вложения в  $BMO(G)$  // Тр. Мат. ин-та им. В. А. Стеклова РАН. 1997. Т. 214, С. 7–24; Испр.: там же. 1997. Т. 219. С. 463.
13. Аджиев С. С. Характеризация функциональных пространств  $B_{p,q}^s(G)$ ,  $L_{p,q}^s(G)$ ,  $W_p^s(G)$  и некоторых других. Приложения // Тр. Мат. ин-та им. В. А. Стеклова РАН. 1999. Т. 227. С. 7–42.
14. Giaquinta M. Multiple integrals in the calculus of variations and nonlinear elliptic problems. Princeton: Princeton Univ. Press, 1983.
15. Крейн С. Г., Петунин Ю. И., Семенов Е. М. Интерполяция линейных операторов. М.: Наука, 1977.
16. Бари Н. К., Стечкин С. Б. Наилучшие приближения и дифференциальные свойства двух сопряженных функций // Тр. Моск. мат. о-ва. 1956. Т. 5. С. 484–521.
17. Spanne S. Some function spaces defined using the mean oscillation over cubes // Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa. Cl. Sci (3). 1965. V. 19. P. 593–608.
18. DiBenedetto E. Degenerate parabolic equations. New York: Springer-Verl., 1993.
19. Гарнетт Дж. Ограниченные аналитические функции. М.: Мир, 1984.
20. Шевчук И. А. Приближение многочленами и следы непрерывных на отрезке функций. Киев: Наук. думка, 1992.
21. Гусейнов Е. Г. Теоремы вложения классов непрерывных функций // Изв. АН Аз СССР. Сер. мат. 1979. Т. 2. С. 57–60.
22. Бесов О. В. Продолжение функций за пределы области с сохранением дифференциально-разностных свойств в  $L_p$  // Мат. сб. 1965. Т. 66, № 1. С. 80–96.

*Статья поступила 17 декабря 2004 г.*

*Покровский Андрей Владимирович  
Институт математики НАН Украины,  
ул. Терещенковская, 3, Киев 01601, Украина  
pokrovsk@imath.kiev.ua*